

*Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 8A van het Besluit Diergeneesmiddelen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.*

## Ferrofumaraat suspensie

### **Farmaceutische vorm:**

Suspensie.

### **Samenstelling:**

Werkzame bestanddeel: ferrofumaraat 20mg/ml, dit komt overeen met 6,5mg ijzer ( $\text{Fe}^{2+}$ ) per ml.

Bevat de volgende hulpstoffen: microkristallijne cellulose, tragacanth, glycerol, methylparahydroxybenzoaat, cacao essence, sacharose, aqua purificata.

### **Eigenschappen:**

Ferrofumaraat behoort tot de groep van ijzerpreparaten. Deze middelen worden gebruikt bij bloedarmoede die veroorzaakt wordt door een tekort aan ijzer in het lichaam.

### **Doeldieren:**

Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond en de kat.

### **Indicaties:**

Ferrofumaraat wordt gegeven bij ijzertekort.

### **Waarschuwingen en contra-indicaties:**

Ferrofumaraat niet gebruiken als er stapeling van ijzer is in het lichaam. Voor jonge dieren kan ferrofumaraat giftig zijn; in lage dosering geven. Voor zover bekend kan ferrofumaraat tijdens de dracht en de lactatieperiode worden gegeven.

### **Toediening / Dosering:**

De gebruikelijke dosering is 3mg/kg 3x per dag. Het kan het beste worden gegeven tussen de maaltijden door, omdat het ijzer dan beter wordt opgenomen. Als er echter veel maag-darmklachten optreden kan het met voedsel worden ingegeven. Schud de suspensie iedere keer voor toedienen!

**Bijwerkingen:**

De meest voorkomende bijwerking zijn maag-darmklachten, zoals braken en diarree. Daarnaast kan de ontlasting zwart van kleur worden. Bij overdosering kunnen versneld hartritme, shock en eventueel coma optreden.

**Interacties met andere geneesmiddelen:**

Bij gelijktijdig geven van antibiotica die behoren tot de tetracyclinen worden zowel het antibioticum als de ferrofumaraat slechter opgenomen. Als beide middelen gegeven moeten worden, dan moet dit met een tussenpose van tenminste 3 uur. Ook de opname van penicillamine en antibiotica die behoren tot de chinolonen wordt door ferrofumaraat verminderd. Indien deze combinatie niet te vermijden is, houdt dan een tussenpose aan van 2 uur. Door toedienen van calciumzouten kan de opname van ferrofumaraat verminderd worden.

**Fabrikant:**

De fabrikant van deze suspensie is Pharmachemie. Registratienummer (RVG) 51411.

**Bewaarcondities:**

Deze suspensie is houdbaar tot op de verpakking vermelde datum mits bewaard bij kamertemperatuur.

Na openen is de suspensie nog 1 maand houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar het geneesmiddel in de oorspronkelijke verpakking en buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng restanten van het geneesmiddel, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar de dierenarts of apotheek.

---

*Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zelffouten en andere onjuistheden.*

*Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.*