

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Metronidazol (poeder voor) suspensie

Samenstelling:

Werkzame bestanddeel: metronidazol in verschillende concentraties tw 40mg/ml 100 mg/ml en 375mg/ml

De Flagyl® suspensie 40 mg metronidazol/ml bevat als hulpstoffen: gezuiverd water, sinaasappelesence, citroenessence, aluminiummagnesiumsilicaat, saccharose, ethanol, propylparahydroxybenzoaat, methylparahydroxybenzoaat en natriumdiwaterstoffosfaat.

De suspensie 100 mg metronidazol/ml bevat als hulpstoffen: gezuiverd water, aluminiummagnesiumsilicaat, ethanol, methylparahydroxybenzoaat en suikerstroop.

Het poeder voor suspensie 375mg metronidazol/ml bevat dezelfde hulpstoffen als genoemd onder Flagyl®.

Eigenschappen:

Metronidazol is een antibioticum dat werkzaam is tegen vele soorten anaerobe bacteriën (wo Clostridia), protozoën/flagellaten (Giardia en Trichomonas).

Doeldieren:

Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij vele diersoorten zoals de hond, de kat, het paard en bijzondere dieren zoals terrariumdieren, vogels en kleine knaagdieren.

Indicaties:

Metronidazol wordt toegepast bij de behandeling van infecties door micro-organismen die gevoelig zijn voor metronidazol.

Waarschuwingen en contra-indicaties:

Bij toepassing van metronidazol bij het paard moet het paard uitgesloten worden voor humane consumptie. Het paspoort dient dus te worden afgetekend voor nooit meer slachten.

Metronidazol dient niet toegediend te worden aan dieren met leveraandoeningen, ernstig zieke dieren en aan drachtige of zogende dieren. Draag handschoenen bij het aanmaken en toedienen en van de drank en was daarna goed de handen.

Toediening en dosering:

De gebruikelijke dosering is bij de hond en kat 20 mg/kg 3 x per dag. De dosering bij het paard is 2 x daags 25mg/kg (komt overeen met 10ml van de 375mg/ml suspensie per 150kg lichaamsgewicht). Voor de overige diersoorten

volg het advies van uw dierenarts.
Goed omschudden voor gebruik.

Bijwerkingen:

Tijdens het gebruik van metronidazol kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Sufheid, coördinatiestoornissen, braken, gebrek aan eetlust en diarree.

Interacties met andere geneesmiddelen:

Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Laat de dierenarts daarom altijd weten als ook andere geneesmiddelen worden gegeven.

Bij het gelijktijdig gebruik van metronidazol en clindamycine of tetracyclinen kan de werking van metronidazol versterkt worden.

Fabrikant:

De registratiehouder van Flagyl is Sanofi-Aventis Nederland BV. RVG: 10322. De suspensies van 100 mg/ml en het poeder voor suspensie 375mg/ml worden gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Bewaarcondities:

Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).

Na openen/aanmaken is de suspensie 1 maand houdbaar mits bewaard bij kamertemperatuur.

Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts of apotheek.

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden.

Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.