

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

GS-441524 50 mg/ml drank

1. Doeldiersoorten

Kat

2. Dosering en wijze van gebruik

Voor inname via de bek.

Scan/klik voor een instructievideo →



Dosering:

- Droge/Natte/Oculaire FIP: 1x daags 15 mg/kg (overeenkomend met 0,3 ml/kg). Als de dosering groter is dan 1ml/keer, dan mag deze dosering verdeeld worden over 2 giften. Bijvoorbeeld 1x daags 1,2 ml, wordt 2x daags 0,6 ml.
- Neurologische FIP: 2x daags 10 mg/kg (overeenkomend met 2x daags 0,2 ml/kg)

De behandelduur is minimaal 12 weken. Bij ca. 25% van de patiënten wordt op geleide van bloedbeeld de behandeling nog enkele weken verlengd.

Tijdens de behandeling zijn enkele controlemomenten noodzakelijk en moet de kat regelmatig worden gewogen voor het aanpassen van de dosering. Een wekelijkse bepaling van het gewicht volstaat.

Bij onvoldoende effect kan de dierenarts besluiten om de dosering te verhogen naar 1-2x daags 20 mg/kg.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Schud voor iedere gift de flacon goed om!

Omschudden is nodig voor een goede verdeling van de werkzame stof en het voorkomen van een doseerfout door een ongelijkmatig verdeeld mengsel.

De drank is zoet van smaak en kan door het kleine volume rechtstreeks in de bek gegeven worden. Indien nodig, mag GS-441524 ook met wat natvoer of een snack gegeven worden. Let hierbij goed op dat de volledige dosis wordt ingenomen.

Spoel het spuitje regelmatig schoon met (warm) water zodat er geen medicatie 'aankooft' op het spuitje zelf. Vervang het spuitje na ca 20 keer.

3. Samenstelling

Per milliliter drank:

Werkzaam bestanddeel: GS-441524 50 mg

Hulpstoffen:

zetmeel, natriumcitraat, citroenzuur, sucralose, natriumbenzoaat (<0,1%), appelzuur, simeticon en water.

Na omschudden ontstaat een witte ondoorzichtige vloeistof. Indien de opgetrokken vloeistof (licht) doorzichtig is, de vloeistof terug spuiten en nogmaals goed schudden.

4. Indicaties

Deze drank wordt gebruikt voor katten met Feline Infectious Peritonitis, afgekort FIP. Dit ziektebeeld wordt vaak gekenmerkt door buikklachten, maar kan ook oogklachten en neurologische klachten geven, en wordt veroorzaakt door het katten corona virus.

5. Eigenschappen

GS-441524 is een antiviraal middel, dat na het stellen van de juiste diagnose, moet worden toegediend gedurende de juiste behandelingsduur in de juiste dosering om de werkzaamheid tegen dit virus te behouden.

6. Bijwerkingen

Voorkomende bijwerkingen zijn: diarree (50%), (lichte) huidklachten (ca. 30%), last van de bek of tanden (ca. 20%).

Omdat de meeste patiënten in de ziekteperiode zijn afgevallen of groeiachterstand hebben opgelopen, wordt vaak een toename van de eetlust gezien (m.n. in beginfase).

7. Contra-indicaties en waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Schud de drank zorgvuldig om voordat de dosering uit de flacon wordt opgetrokken!

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Voorkom dat het geneesmiddel aan uw handen komt, en was uw handen na toediening.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Er zijn geen interacties bekend met GS-441524.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

Er is geen informatie over de gevolgen van overdosering beschikbaar, en er is geen antidotum. Neem contact op met uw dierenarts om uw dier te laten beoordelen als er een overdosering is toegediend.

Dracht en lactatie:

Er is niets bekend over de toepassing van dit geneesmiddel tijdens dracht of lactatie.

8. Wachttijden

Dit geneesmiddel mag niet toegepast worden bij voedselproducerende dieren.

9. Bewaarcondities

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Houdbaar tot einde datum verpakking.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie

Dit geneesmiddel wordt geproduceerd door:

Apotheek faculteit Diergeneeskunde

Yalelaan 106, 3584 CM Utrecht

apotheek.vet@uu.nl



Scan/klik
voor de website

12. Kanalisatie

Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en andere onjuistheden. Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.