

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Neotriam 3,5/1 mg/g oorzalf

1. Doeldiersoorten

Honden en katten

2. Dosering en wijze van gebruik

Voor toediening in het oor.

Scan/klik voor een instructievideo →



Gebruikelijke dosering: 1x daags een deel van de spuit met zalf toedienen in het aangedane oor/oren gedurende 1 week. Daarna bekijken of langere therapie met neomycine noodzakelijk is. Gebruikelijk is om de gehele gehoorgang te vullen maar volg hierbij de instructies van uw dierenarts.

Wanneer geen antibioticum meer nodig is kan worden overgestapt op een oorzalf met alleen triamcinolon om af te bouwen. In overleg met de dierenarts afbouwen in frequentie (niet in hoeveelheid).

Aanwijzingen voor een juiste toediening

De zalf kan rechtstreeks vanuit de spuit toegediend worden in de gehoorgang. Het gebruik van een opzetcanule is meestal niet nodig en is mogelijk zelfs ongewenst in verband met het risico op het achterblijven van de canule in de gehoorgang.

Gebruik bij behandeling van beide oren aparte spuit voor het linker en het rechteroor, om kruisbesmetting te voorkomen.

3. Samenstelling

Per gram zalf:

Werkzaam bestanddeel:

Neomycine 3,5 mg + Triamcinolon 1 mg

Hulpstoffen:

Witte vaseline, paraffine vloeibaar 110-230 mPa.s.

Neotriam is een witte zalf vrij van deeltjes

4. Indicaties

Neotriam oorzalf wordt toegepast voor de behandeling van ontstekingen van de uitwendige gehoorgang (otitis externa) die veroorzaakt worden door bacteriën die gevoelig zijn voor neomycine.

5. Eigenschappen

Neomycine is een antibioticum en behoort tot de groep aminoglycosiden. Het is werkzaam tegen gram-positieve en gram-negatieve bacteriën. Triamcinolonacetonide is een corticosteroid en werkt ontstekingsremmend. Het vermindert roodheid, zwellingen en jeuk.

6. Bijwerkingen

Neomycine kan tot overgevoeligheidsreacties leiden. Deze overgevoeligheidsreacties uiten zich in irritaties, zwellingen en rode plekken. Triamcinolonacetonide kan aanleiding geven tot veel drinken en plassen. In een dergelijk geval moet in overleg met de dierenarts de dosering worden verlaagd. Gezien de lokale toepassing komen deze bijwerkingen slechts zeer zelden voor.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Deze oorzalf is bedoeld voor gebruik in de buitenste gehoorgang. Geen enkel oorp implantaat is geschikt voor gebruik in het middenoor. Als er sprake is van een geperforeerd trommelvlies en lokale behandeling van de buitenste gehoorgang is geïndiceerd, heeft het gebruik van een oorzalf de voorkeur boven een oordruppel. Door de hogere viscositeit van de zalf is de kans dat het product het middenoor bereikt minder groot.

De ototoxiciteit van aminoglycosiden treedt voornamelijk op bij parenteraal gebruik en is, bij lokaal gebruik, niet afhankelijk van een intact trommelvlies.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Wisselwerking met andere geneesmiddelen is niet te verwachten.

Dracht en lactatie:

Over het gebruik van dit middel tijdens de dracht zijn geen gegevens beschikbaar.

8. Wachtijden

Niet van toepassing.

9. Bewaarcondities

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren op een donkere en droge plek bij kamertemperatuur (15-25°C). Houdbaar tot einde datum verpakking.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie

Dit geneesmiddel wordt geproduceerd door:

Apotheek faculteit Diergeneeskunde

Yalelaan 106, 3584 CM Utrecht

apotheek.vet@uu.nl



Scan/klik
voor de website

12. Kanalisatie

Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.