

*Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.*

## Neomycine oorzalf

### Farmaceutische vorm:

Oorzalf

### Samenstelling:

Werkzame bestanddeel: neomycinesulfaat 3,5mg/g.

Bevat de volgende hulpstoffen: witte vaseline, paraffine vloeibaar  
110-230mPa.s.

### Eigenschappen:

Neomycine is een antibioticum en behoort tot de groep aminoglycosiden. Het is werkzaam tegen gram-positieve en gram-negatieve bacteriën.

### Doeldieren:

Er is ervaring met dit geneesmiddel bij de hond en (in beperkte mate) bij de kat.

### Indicaties:

Neomycine oorzalf wordt toegepast voor de behandeling van een ontsteking van de uitwendige gehoorgang die veroorzaakt wordt door bacteriën.

### Waarschuwingen en contra-indicaties:

Deze oorzalf is bedoeld voor gebruik in de buitenste gehoorgang. Geen enkel oorpreparaat is geschikt voor gebruik in het middenoor. Als er sprake is van een geperforeerd trommelvlies èn lokale behandeling van de buitenste gehoorgang is geïndiceerd, heeft het gebruik van een oorzalf de voorkeur boven een oordruppel. Door de hogere viscositeit van de zalf is de kans dat het product het middenoor bereikt minder groot.

De ototoxiciteit van aminoglycosiden treedt voornamelijk op bij parenteraal gebruik en is, bij lokaal gebruik, niet afhankelijk van een intact trommelvlies. Over het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de dracht en lactatie zijn geen gegevens beschikbaar.

### Toediening / Dosering:

De dierenarts dient voor gebruik van deze oorzalf de gehoorgang schoon te spoelen. Gebruikelijke dosering is gedurende 1 week 1 x per dag de gehoorgang opvullen met zalf. Na deze week kan worden bekeken of langer gebruik van neomycine noodzakelijk is. Als er geen antibioticum meer nodig is kan worden

overgestapt op een oorzalf met triamcinolon om af te bouwen. In overleg met de dierenarts afbouwen in frequentie (niet in hoeveelheid).

De zalf kan rechtstreeks vanuit de injector toegediend worden in de gehoorgehoorgang. Het gebruik van een canule is meestal niet nodig en is zelfs ongewenst in verband met het risico op het achterblijven van de canule in de gehoorgang. Zie de onderstaande QR code voor een instructie.

**Bijwerkingen:**

Neomycine kan tot overgevoeligheidsreacties leiden. Deze overgevoeligheidsreacties uiten zich door irritaties, zwellingen en rode plekken.

**Interacties met andere geneesmiddelen:**

Wisselwerking met andere geneesmiddelen is niet te verwachten.

**Fabrikant:**

Dit geneesmiddel is gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

**Bewaarcondities:**

Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).

Na openen is de oorzalf 1 maand houdbaar.

**Scan de onderstaande code om instructievideo's te bekijken voor het toedienen van geneesmiddelen bij dieren:**

