

*Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.*

## **Voriconazol poeder voor suspensie**

### **Samenstelling:**

Werkzame bestanddeel: Voriconazol 150mg of 450mg

De suspensie bevat na bereiden per ml 10mg voriconazol. De suspensie is wit tot gebroken wit.

Bevat de volgende hulpstoffen: Sucrose, colloidaal siliciumdioxide, titaandioxide (E171), xanthaangom, natriumcitraat, citroenzuur, natriumbenzoaat (E211), sinaasappelaroma.

### **Eigenschappen:**

Voriconazol is een antischimmelmiddel en behoort tot de groep van de azolen. Het doodt schimmels of remt de groei ervan.

### **Doeldieren:**

Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de baarddagaam en bij de vogel.

### **Indicaties:**

Voriconazol wordt gebruikt bij schimmelinfecties veroorzaakt door *Aspergillus*, *Candida*, *Chrysosporium* of *Nannizziopsis vriesii*.

### **Waarschuwingen en contra-indicaties:**

Voriconazol is een risicovolle stof daarom moeten personen die hiermee niet behandeld worden, blootstelling aan deze stof voorkomen. Zwangere vrouwen moeten dit diergeneesmiddel niet klaarmaken of toedienen.

Voriconazol niet gebruiken wanneer een allergische reactie is opgetreden bij gebruik van andere azolen. Bij leveraandoeningen liever niet gebruiken, of de dosering verlagen. De huid kan door voriconazol gevoeliger zijn voor UV stralen, voornamelijk bij langdurig gebruik: vermijd teveel zonlicht.

### **Toediening:**

Indien het poeder nog niet in water is verwerkt, dient dat te gebeuren volgens onderstaande instructies alvorens het toe te dienen.

### **Instructies voor de bereiding:**

Zwangere vrouwen moeten dit diergeneesmiddel niet klaarmaken of toedienen.

Draag de meegeleverde handschoenen en stofmasker bij het aanmaken van de drank. Tik op de fles om het poeder los te maken\*.

Voor 150mg: Voeg met behulp van de meegeleverde 20ml spuit 13,5ml kraanwater toe.

Voor 450mg: Voeg met behulp van de meegeleverde 50ml spuit 40,5ml kraanwater toe.

Schud gedurende 1 minuut.

\*Het kan zijn dat het poeder erg compact is geworden of veel grote klonten bevat. Deze verdwijnen echter vrij gemakkelijk na het toevoegen van water.

Schud de flacon voor iedere toediening.

### **Dosering:**

De gebruikelijke dosering hangt af van de diersoort en indicatie:

Vogels met aspergillose infectie: 10-20 mg/kg 2x per dag.

Baardagamen met chrososporium of nannizziopsis vriesii infectie: 10 mg/kg 1-2 x per dag.

Bij verminderde leverfunctie kan het nodig zijn de dosering te verlagen, of het gebruik te stoppen.

### **Bijwerkingen:**

Vaak voorkomend: verandering in gezichtsvermogen, huiduitslag, koorts, misselijkheid, braken, diarree. Minder vaak optredende bijwerkingen: ontsteking van neusbijholten, zwakte, anemie, laag bloedsuiker, laag aantal witte bloedcellen, nierfalen. Mogelijk optredende ernstige bijwerkingen: pancreatitis, geelzucht, huiduitslag. Na blootstelling aan licht of zon zelden ernstige huidreacties.

### **Interacties met andere geneesmiddelen:**

Voriconazol remt een aantal leverenzymen die betrokken zijn bij de afbraak van geneesmiddelen (CYP2C19, CYP2C9 en CYP3A4). Voriconazol wordt ook door deze enzymen afgebroken. Geneesmiddelen die door deze enzymen worden afgebroken, of die invloed hebben op deze enzymen, niet gelijktijdig gebruiken. Dit betreft o.a. cisapride, fenobarbital, ciclosporine. Laat de dierenarts weten indien ook andere geneesmiddelen worden gegeven.

### **Fabrikant:**

Dit is een product van de Apotheek faculteit Diergeneeskunde, Utrecht.

Het hierin verwerkte product is VFend poeder voor orale suspensie, registratiehouder Pfizer, registratienummer EU/1/02/212/026.

### **Bewaarcondities:**

Voor bereiden de flacon bewaren in de koelkast (2 - 8°C).

Na bereiden is de suspensie 14 dagen houdbaar, indien bewaard bij kamertemperatuur (15 - 25°C). Na bereiden niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar de dierenarts of apotheek.