

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Zilversulfadiazine 10 mg/g oorzalf

1. Doeldiersoorten

Honden en katten

2. Dosering en wijze van gebruik

[Scan voor een instructievideo →](#)



Voor toediening in het oor.

Dosering: 1x daags een deel van de spuit met zalf toedienen in het aangedane oor/oren. Gebruikelijk is om de gehele gehoorgang te vullen maar volg hierbij de instructies van uw dierenarts.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

De zalf kan rechtstreeks vanuit de spuit toegediend worden in de gehoorgang. Het gebruik van een opzetcanule is meestal niet nodig en is mogelijk zelfs ongewenst in verband met het risico op het achterblijven van de canule in de gehoorgang.

Gebruik bij behandeling van beide oren aparte spuit voor het linker en het rechteroor, om kruisbesmetting te voorkomen.

3. Samenstelling

Per gram zalf:

Werkzaam bestanddeel:

zilversulfadiazine 10 mg

Hulpstoffen:

witte vaseline, paraffine vloeibaar 110-230mPa.s

Geel-witte dikke zalf verpakt in een spuitvormige verpakking.

4. Indicaties

Een bacteriële ontsteking van de uitwendige gehoorgang, in het bijzonder Pseudomonas aeruginosa infecties die niet hebben gereageerd op eerdere behandelingen.

5. Eigenschappen

Zilversulfadiazine is sterk werkzaam tegen Gram-negatieve en Gram-positieve pathogene micro-organismen, met name Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aerogenes en Klebsiella pneumoniae. Na opbrengen valt het deels uit elkaar in zilver(ionen) en sulfadiazine. Het effect is lokaal.

Deze oorzalf is bedoeld voor behandeling van een infectie van de buitenste gehoorgang. Omdat de zalf geen hulpstoffen bevat die schadelijk zijn voor het middenoor is toepassing bij geperforeerd trommelvlies mogelijk.

6. Bijwerkingen

Zilversulfadiazine kan tot overgevoelighedsreacties leiden, bij het dier of bij de persoon die de zalf toedient. Deze overgevoelighedsreacties uiten zich als lokale reacties. Neem contact op met de dierenarts als dit gebeurt.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen

Overgevoeligheid voor zilversulfadiazine of een van de hulpstoffen in de oorzalf.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Gebruik voor ieder oor een eigen verpakking en noteer L of R op de spuiten.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Handen wassen voor en na aanbrengen van de oorzalf. Overweeg het dragen van handschoenen.

Dracht en lactatie:

Over het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de dracht en lactatie zijn geen gegevens beschikbaar. Gezien de lokale toepassing kan het belang van het moederdier prevaleren.

8. Wachttijden

Niet van toepassing.

9. Bewaarcondities

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Ongeopende verpakking bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Na openen 1 maand houdbaar bij kamertemperatuur.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie

Dit geneesmiddel wordt geproduceerd door:

Apotheek faculteit Diergeneeskunde

Yalelaan 106, 3584 CM Utrecht

030 253 1598

apotheek.vet@uu.nl



Scan voor de website

12. Kanalisatie

Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.