

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Paracetamol drank en tabletten

Samenstelling

Werkzaam bestanddeel tablet: paracetamol 500mg

Werkzaam bestanddeel drank: paracetamol 24mg per ml

De tablet bevat de volgende hulpstoffen: Polyvidon(E1201), maïszetmeel, stearinezuur(E570) en natriumzetmeelglycolaat.

De drank bevat de volgende hulpstoffen: polyethyleenglycol 400(E1521), glycerol(E422), maltitol(E965), natriummethylhydroxybenzoaat(E219), natriumpropylhydroxybenzoaat(E217), natriumcyclamaat(E952), natriumcitraat (E331), citroenzuur (E330), frambozenaroma en water

Eigenschappen

Paracetamol heeft een pijnstillende en koortsverlagende, maar slechts een beperkte ontstekingsremmende werking.

Het exacte werkingsmechanisme is nog niet opgehelderd. Mogelijk berust het effect deels op remming van het enzym cyclo-oxygenase (COX), maar op een andere manier dan zogenoemde Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs).

Doeldieren

Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond.

LET OP: NIET GEBRUIKEN BIJ DE KAT!!

Indicaties

Paracetamol wordt gebruikt voor de behandeling van pijn bij honden als de reguliere pijnstillers voor honden onvoldoende pijnstilling geven of niet gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld bij verhoogde kans op maagzweren, in het geval van ernstig nierfalen of dracht.

Waarschuwingen en contra-indicaties

LET OP: Paracetamol is erg giftig voor katten en fretten. Dus NOOIT paracetamol toedienen aan deze dieren!

Bij rectale toepassing wordt te weinig paracetamol opgenomen om een pijnstillend effect te zien. Daarom kunnen zetpillen niet bij honden gebruikt worden.

Honden scheiden paracetamol op een andere manier uit dan mensen, daarom moet paracetamol met voorzichtigheid gebruikt worden en uitsluitend op voorschrift van een dierenarts. Ook sommige hulpstoffen zijn niet goed voor honden; gebruik daarom alleen het voorgeschreven product met paracetamol.

Niet gebruiken bij honden met problemen met de leverfunctie.

Toediening / Dosering

Via de bek toedienen.

Paracetamol maximaal 5 dagen geven aan honden.

De gebruikelijke dosering bij honden is 15-20mg per kg lichaamsgewicht 3-4x per dag.

Het is belangrijk bij gebruik bij de hond dat de voorgeschreven dosering strikt wordt gevolgd.

Geef niet meer en niet langer dan voorgeschreven. Gebruik ook geen doseringen die gelden voor mensen.

Bijwerkingen

Verminderde eetlust, braken, diarree, geelzucht (geelkleuring van oogwit en tandvlees) of bloed bij de ontlasting of het braaksel kunnen voorkomen. Stop direct met de behandeling als deze verschijnselen optreden en neem contact op met een dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen

Geneesmiddelen kunnen elkaar mogelijk beïnvloeden. Laat uw dierenarts daarom altijd weten indien ook andere geneesmiddelen worden gegeven.

Fabrikant

Tablet: diversen

Drank: Daro RVG 6566

Bewaarcondities:

De tabletten zijn houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum mits bewaard bij kamertemperatuur.

De drank is na eerste opening van de flacon nog 6 maanden houdbaar.

Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Breng restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts of apotheek.