

*Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.*

## **Metoclopramide tablet en drank**

### **Samenstelling:**

Tablet werkzame bestanddeel:

Metoclopramide hydrochloride (als monohydraat) 10mg.

Bevat de volgende hulpstoffen:

povidon, mannitol, cellulose, colloïdaal silica en magnesiumstearaat.

Drank werkzame bestanddeel:

Metoclopramide hydrochloride 1mg per ml

Bevat de volgende hulpstoffen: MOB, POB, hydroxyethylcellulose, nacyclamaat, nasaccharine, citroenzuur, aroma's (zoete sinaasappel en abrikoos) en water.

### **Eigenschappen:**

Metoclopramide heeft centrale en perifere antidopaminerge eigenschappen. Dit wil zeggen dat het in de hersenen en in het lichaam dopamine receptoren blokkeert. Blokkering van de dopamine receptoren in het braakcentrum zorgt ervoor dat metoclopramide kan worden gebruikt om braken te remmen. Daarnaast zorgt metoclopramide, via de dopamine receptoren in het lichaam, voor een snellere maaglediging en voor meer beweging van het maagdarmkanaal. Beide effecten dragen bij aan vermindering van braken en misselijkheid.

### **Doeldieren:**

In Nederland zijn diverse diergeneesmiddelen met metoclopramide voor honden en katten toegelaten.

### **Indicaties:**

Metoclopramide wordt gebruikt bij braken, misselijkheid en bij aandoeningen die veroorzaakt worden door een te weinig bewegend maagdarmkanaal (reflux)

### **Waarschuwingen en contra-indicaties:**

Niet toepassen in geval van overgevoeligheid voor metoclopramide of één van de hulpstoffen of als er sprake is van bloeding of obstructie in of perforatie van het maagdarmkanaal. Niet of onder nauw toezicht van een dierenarts toepassen bij dieren met epilepsie.

**Toediening / Dosering:**

De gebruikelijke dosering is 0,15 mg/kg lichaamsgewicht 3-4 maal daags. De tabletten zijn voorzien van een breukstreep en kunnen in tweeën gedeeld worden. Indien minder dan 5mg per gift gewenst is, kan beter uitgeweken worden naar metoclopramide 1mg/ml drank.

**Bijwerkingen:**

Extrapiramidale verschijnselen, dit zijn oncontroleerbare bewegingen. Deze bijwerking treedt met name bij hogere doseringen op.  
Sufheid en diarree.

**Interacties met andere geneesmiddelen:**

Bij combinatie met SSRI's (zoals fluoxetine en paroxetine) neemt het risico op extrapiramidale verschijnselen toe. Bovendien stijgt de plasmaconcentratie van metoclopramide door fluoxetine.

Stoffen die juist een stimulerend effect op de dopamine receptoren hebben (zoals pergolide) zullen de werking van metoclopramide tegengaan en andersom ook.

**Fabrikant:**

Tabletten: diverse leveranciers bv TEVA (RVG 9715).

NB alléén als de veterinaire tabletten niet verkrijgbaar zijn, zal uitgeweken worden naar een humane variant.

Drank: Apotheek fD (Emeprid RegNL 106868 uitgevuld per 20ml)

**Bewaarcondities:**

De tabletten en de drank zijn houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum mits droog bewaard bij kamertemperatuur.

Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Breng restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts of apotheek.