

Dit geneesmiddel is in NL geregistreerd voor gebruik bij een andere diersoort. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Doxylin® 50 % poeder

1. Doeldiersoorten

Dit geneesmiddel is in NL toegelaten voor gebruik bij kalveren, varkens en kippen. Er is echter ook ervaring mee bij paarden.

2. Dosering en wijze van gebruik

Scan/klik voor een instructievideo →



Voor inname via de mond.

Gebruikelijke dosering: 10 mg/kg 2x daags.* Dit komt overeen met 2g/100 kg lichaamsgewicht.

*Deze bijsluiter heeft alleen betrekking op het gebruik van Doxylin® bij paarden. Voor informatie en doseringen bij de andere genoemde doeldiersoorten, maak gebruik van de officiële bijsluiter van Doxylin® poeder.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Dit geneesmiddel is niet op de markt gebracht voor de behandeling van paarden. Van het poeder moet per gift, per patiënt, het gewenste gewicht worden afgemeten om tot een juiste dosering te komen. Hiervoor wordt per patiënt een maatschepje beschikbaar gesteld. Om volledige inname te garanderen, is het advies om de poederportie te verwerken tot een appelmoespuit. Lees hiervoor eerst de tekst onder 'Contra-indicaties en waarschuwingen'.

Een groen maatschepje (van 15ml) bevat ongeveer 11gram en is dus voldoende voor 550kg paard.

3. Samenstelling

Per gram poeder:

Werkzaam bestanddeel:

Doxycyclinehydraat 500 mg

Hulpstoffen

Hulpstoffen kunnen verschillen afhankelijk van de fabrikant. Informatie hierover is te vinden in de originele bijsluiter. Deze kan worden geraadpleegd via de geneesmiddeleninformatiebank op CBG-Meb.nl met behulp van het [Rxxxxx] nummer op het etiket. Of neem contact op met de apotheek.

4. Indicaties

Doxycycline wordt gebruikt bij infecties van o.a. de luchtwegen, maar bij paarden voornamelijk bij infecties met Lawsonia Intracellularis.

5. Eigenschappen

Doxycycline is een antibioticum dat werkzaam is tegen een breed spectrum van micro-organismen. Het remt de aanmaak van eiwitten van deze micro organismen waardoor zij in hun groei geremd worden.

6. Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van doxycycline bij paarden is diarree.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Er bestaat een kans op dysbacteriose (ernstige diarree). Als doxycycline in de slokdarm blijft plakken, kan irritatie, slokdarmontsteking of zelfs een slokdarmstrictuur ontstaan. Meng het poeder daarom met zoveel mogelijk appelmoes om misselijkheid of slokdarmbeschadiging te voorkomen. Spoel, indien mogelijk, de mond na met water (zonder dat daarmee de doxycycline wordt weggespoeld).

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Blootstelling aan Doxylin® (doxycycline) poeder tijdens het afwegen en klaarmaken van de appelmoesspuit moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Doxycycline kan huidirritatie en irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Daarnaast veroorzaakt doxycycline ernstige oogirritatie. Draag daarom bij het klaarmaken van de appelmoesspuit een P2 stofmasker, handschoenen en een veiligheidsbril.

8. Wachttijden

Wachttijd paarden voor humane consumptie: 28 dagen.

Doxycycline valt volgens het FEI-reglement onder 'vrij medicijngebruik'. Gebruik tijdens een wedstrijd is toegestaan.

9. Bewaarcondities

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C), niet in de koelkast of vriezer. Ongeopende verpakking houdbaar tot einde datum verpakking. Houdbaarheid na openen: 3 maanden.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie

Dit betreft een geregistreerd goedgekeurd diergeneesmiddel en wordt door Apotheek fD geleverd op basis van een Cascade toepassing ten behoeve van toepassing bij de genoemde doeldiersoort(en).

12. Kanalisatie

Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.