

*Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.*

## **Metronidazol 40 mg/ml drank**

### **1. Doeldiersoorten**

Dieren met laag lichaamsgewicht, zoals: terrariumdieren, vogels, konijnen en kleine knaagdieren.

### **2. Dosering en wijze van gebruik**

Voor inname via de bek.

Aanbevolen dosering bij reptielen, konijnen en knaagdieren: 1 - 2x daags 20 mg/kg (overeenkomend met 0,5 ml/kg drank).

Aanbevolen dosering bij vogels: 1 - 2x daags 25 - 50 mg/kg (overeenkomend met 0,6 - 1,25 ml/kg drank).

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Goed omschudden voor elk gebruik en draag handschoenen. Geef de medicatie bij een maaltijd of net na een maaltijd om de kans op maagklachten te verminderen.

### **3. Samenstelling**

Per milliliter drank:

Werkzaam bestanddeel:

Metronidazol (als metronidazolbenzoaat) 40 mg

Hulpstoffen

Hulpstoffen kunnen verschillen afhankelijk van de fabrikant. Informatie hierover is te vinden in de originele bijsluiter. Deze kan worden geraadpleegd via de geneesmiddeleninformatiebank op CBG-Meb.nl met behulp van het [Rxxxxx] nummer op het etiket. Of neem contact op met de apotheek.

### **4. Indicaties**

Metronidazol wordt toegepast bij de behandeling van infecties door micro-organismen die gevoelig zijn voor metronidazol.

### **5. Eigenschappen**

Metronidazol is een antibioticum dat werkzaam is tegen vele soorten anaerobe bacteriën (waaronder Clostridia maar ook tegen protozoën en flagellaten (Giardia en Trichomonas).

### **6. Bijwerkingen**

Tijdens het gebruik van metronidazol kunnen de volgende bijwerkingen optreden: sufheid, coördinatiestoornissen, gebrek aan eetlust en diarree.

### **7. Contra-indicaties en waarschuwingen**

Niet gebruiken bij dieren met leveraandoeningen, ernstig zieke dieren en aan drachtige of zogende dieren.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Draag altijd handschoenen tijdens het toedienen van dit geneesmiddel.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Laat de dierenarts daarom altijd weten als ook andere geneesmiddelen worden gegeven. Gelijktijdig gebruik van clindamycine of tetracyclines, kan de werking van metronidazol versterken.

Dracht en lactatie:

Metronidazol dient niet toegediend te worden aan drachtige dieren of zogende dieren.

**8. Wachttijden**

Niet van toepassing.

**9. Bewaarcondities**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C). Na openen is de drank 1 maand houdbaar bij kamertemperatuur.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

**10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan**

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

**11. Bereidende instantie**

Dit betreft een humaan geregistreerd product (Flagyl®) en wordt omgepakt door Apotheek fD in 20 ml flacons voorzien van een doseerdop ten behoeve van toepassing bij de genoemde doeldiersoort(en).

**12. Kanalisisatie**

Dit geneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.