Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Rivaroxaban (Xarelto®) 2,5 en 15 mg tabletten

1. Doeldiersoorten
Honden en katten

2. Dosering en wijze van gebruik
Voor inname via de bek.
Gebruikelijke dosering:
Scan/klik voor een instructievideo →
- Honden: 1x daags 0,5 – 2 mg/kg, eventueel 2x daags.
- Katten: 1x daags 2,5 mg/kat (of 0,5 – 1 mg/kg).

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Rivaroxaban (Xarelto®) kan met of zonder eten gegeven worden. Indien nodig, mogen de tabletten gebroken of vermalen worden. Vermalen tabletten in appelmoes of water zijn 4 uur houdbaar. Ingeven van vermalen tabletten van 15 mg dient direct gevolgd te worden door inname van eten. Geef dagelijks rond hetzelfde tijdstip.

Lees voor gebruik de 'contra-indicaties en waarschuwingen'.

3. Samenstelling
Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Rivaroxaban 2,5 of 15 mg tabletten
Hulpstoffen
Hulpstoffen kunnen verschillen afhankelijk van de fabrikant. Informatie hierover is te vinden in de originele bijsluiter. Deze kan worden geraadpleegd via de geneesmiddeleninformatiebank op CBG-Meb.nl met behulp van het [Rxxxxx] nummer op het etiket. Of neem contact op met de apotheek.

Het zijn gekleurde tabletten, waarbij de kleur verschilt per sterkte en merk. Xarelto hanteert lichtgeel voor 2,5 mg en rood voor 15 mg tabletten.

4. Indicaties
Rivaroxaban wordt voorgeschreven om bloedstolsels te voorkomen of te behandelen bij honden en katten die hierop een verhoogd risico hebben.

5. Eigenschappen
Rivaroxaban is een antistollingsmedicijn ('bloedverdunner') en remt de vorming van stolsels/bloedpropjes door remming van stollingsfactoren (trombine & factor Xa).

6. Bijwerkingen
Bij mensen zijn de meest voorkomende bijwerkingen: bloedingen, misselijkheid, braken, diarree en verhoogde leverwaarden.
Bij honden en katten kunnen kleine bloedingen en braken voorkomen.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen
Niet gebruiken bij dieren: die allergisch zijn voor rivaroxaban of een van de hulpstoffen of dieren die ongecontroleerde bloedingen hebben.
Niet gebruiken in geval van: een verminderde werking van de nier- of lever.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:
Tijdens de behandeling met rivaroxaban kunnen blauwe plekken of bloedingen optreden. Neem direct contact op met uw dierenarts wanneer er sprake is van bloedingen of er vermoeden is van interne bloedingen.

Geef een vergeten dosis binnen dezelfde dag alsnog zo snel mogelijk in. Ga de volgende dag verder met het normale doseerschema. Stop de behandeling niet zonder overleg met de dierenarts.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Gelijktijdig gebruik van rivaroxaban met antischimmelmedicatie (in bijzonder azolen), andere stollingsmedicatie, bloedplaatjesremmers, CYP3A4-inductoren, fluoxetine, antibiotica (in bijzonder macroliden) en bepaalde pijnmedicatie (NSAID's) kan de werking van rivaroxaban beïnvloeden. Voorzichtigheid is geboden bij het combineren van deze middelen met rivaroxaban.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Overdosering kan leiden tot bloedingen. Behandeling is vaak ondersteunend en op basis van klinische verschijnselen o.a. bloedwaarden (protrombine tijd en aPTT). Behandeling met actieve kool kan zinvol zijn bij inname <2 uur.
In geval van mogelijke overdosering, neem zo spoedig mogelijk contact op met uw dierenarts.

Dracht en lactatie:
Gebruik bij drachtige dieren wordt afgeraden in verband met mogelijke schade aan de foetus. Bij lactatie is het risico onbekend en wordt gebruik daarom afgeraden.

8. Wachttijden
Niet van toepassing.

9. Bewaarcondities
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Houdbaar tot einde datum verpakking.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan
Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie
Dit betreft humaan geregistreerde tabletten en wordt door Apotheek fD geleverd op basis van een Cascade toepassing ten behoeve van toepassing bij de genoemde doeldiersoort(en).

12. Kanalisatie
Dit geneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en andere onjuistheden. Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.