*Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.*

# Pentoxifylline 20 mg/ml drank

## 1. Doeldiersoorten
Vogels

## 2. Dosering en wijze van gebruik
Voor inname via de bek.
Scan/klik voor een instructievideo →
Gebruikelijke dosering:
- doorbloedingsproblemen: 1 – 2 maal daags 15 mg/kg.

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Pentoxifylline mag met voeding gegeven worden.

## 3. Samenstelling
Per milliliter drank:
Werkzaam bestanddeel:
Pentoxifylline 20 mg/ml drank
Hulpstoffen**:**
Methylparahydroxybenzoaat, natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriummonowaterstoffosfaat, sacharose en water.

De drank is een heldere oplossing.

## 4. Indicaties
Pentoxifylline wordt voorgeschreven bij chronische klachten ten gevolge van doorbloedingsstoornissen geassocieerd met atherosclerose.

## 5. Eigenschappen
Pentoxifylline is een stof verwant aan cafeïne en theofylline. Hoe pentoxifylline werkt is nog steeds niet helemaal bekend. Pentoxifylline remt het samenklonteren van bloedplaatjes en verhoogt de vervormbaarheid van rode bloedcellen. Hierdoor neemt de viscositeit van bloed af en zou de doorstroming van bloedvaten kunnen verbeteren.

## 6. Bijwerkingen
Benauwdheid, onrust, hartritmestoornissen, braken en misselijkheid.
Bloedbeeldafwijkingen en ernstige allergische reacties kunnen optreden.

## 7. Contra-indicaties en waarschuwingen
Niet gebruiken in geval van een overgevoeligheid voor pentoxifylline of hulpstoffen, bij bloedingen, te lage bloeddruk en leverfunctiestoornissen.

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:
Bij dieren met nierproblemen kan het nodig zijn de dosering van pentoxifylline te verlagen.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Gelijktijdig gebruik van maagzuurremmers die cimetidine bevatten kan ervoor zorgen dat de afbraak van pentoxifylline en actieve metabolieten wordt vertraagd en de werking wordt versterkt. Ook is er dan meer kans op bijwerkingen.

Dracht en lactatie:
Gebruik tijdens de dracht wordt afgeraden in verband met te weinig ervaring.

## 8. Wachttijden
Niet van toepassing.

## 9. Bewaarcondities
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Na openen 3 maanden houdbaar.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

## 10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan
Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.
Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

## 11. Bereidende instantie

De drank wordt geproduceerd door:
Apotheek faculteit Diergeneeskunde
Yalelaan 106, 3584 CM Utrecht
apotheek.vet@uu.nl

Scan/klik
voor de website

## 12. Kanalisatie
Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.

*Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en andere onjuistheden. Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.*