Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Trazodon 50 mg en 100 mg tabletten

1. Doeldiersoorten
Honden en katten

2. Dosering en wijze van gebruik
Voor inname via de bek.
Gebruikelijke dosering:
Scan/klik voor een instructievideo →

Hond:
- Stressvolle gebeurtenis: 5 – 7,5 mg/kg 90 – 120 minuten voor gebeurtenis ingeven. Kan opgehoogd worden tot 19,5 mg/kg/dag bij agressieve honden of bij grote angst/stress. Lagere doseringen ook te combineren met 10 mg/kg gabapentine.
- Postoperatieve beperking/ziekenhuisopname: 2x daags 3 – 7 mg/kg. Ophogen van de dosering (10 – 12 mg/kg) **of** de frequentie (3x daags) kan nodig zijn. Gebruik tot minimaal 4 weken postoperatief is onderzocht.
- Aanvullende behandeling stress gerelateerde problemen: startdosering is 1 – 2x daags ~2,5 – 5 mg/kg gedurende 3 dagen. Indien nodig, stapsgewijs ophogen tot 19,5 mg/kg/dag.

Kat:
- Stressvolle gebeurtenis: 50 mg/**kat** (!) 60 – 90 minuten voor gebeurtenis ingeven OF 5 mg/kg in combinatie met 10 mg/kg gabapentine.

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Trazodon mag zowel met voedsel gegeven worden als op een lege maag.

3. Samenstelling
Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Trazodon 50 mg of 100 mg
Hulpstoffen**:**
Hulpstoffen kunnen verschillen afhankelijk van de fabrikant. Informatie hierover is te vinden in de originele bijsluiter. Deze kan worden geraadpleegd via de geneesmiddelinformatiebank op CBG-Meb.nl met behulp van het [Rxxxxx] nummer op het etiket. Of neem contact op met de apotheek.

Filmomhulde tabletten met een of meerdere breukstrepen.

4. Indicaties
Trazodon dient als kalmeringsmiddel bij stressvolle gebeurtenissen, zoals een dierenartsbezoek, of postoperatief om honden rustig te houden in de herstelperiode.

5. Eigenschappen
Trazodon verhoogt de hoeveelheid serotonine (een stof die angst en spanningen remt) in de hersenen.

6. Bijwerkingen
Trazodon wordt over het algemeen goed getolereerd. De meest voorkomende bijwerkingen bij honden zijn braken, diarree, coördinatie problemen en sufheid. Ook gemeld zijn versneld hartritme, nervositeit, veranderingen in gedrag.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:
Voorzichtigheid is geboden bij ernstige hartziekte en bij hartritme-, leverfunctie- en nierfunctiestoornissen. Trazodon kan een toename in het bloedingsrisico geven.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Contacteer de dierenarts bij trillen, wijde pupillen en onrust na trazodon gebruik.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
De volgende interacties zijn bekend bij gelijktijdig gebruik van trazodon:
(1) Verhoogd bloedingsrisico i.c.m. antistollingsmiddelen, zoals clopidogrel en rivaroxaban. Monitoring is noodzakelijk. (2) Verhoogd risico serotoninesyndroom i.c.m. antidepressiva, tramadol en andere serotonerge middelen, zoals metoclopramide. Monitor de mate van sufheid en symptomen van het serotoninesyndroom (koorts, zweten, diarree, verwijde pupillen, (t)rillen, hyperreflexie, sufheid/verwardheid, agitatie, verhoogde hartslag). NIET combineren met MAO-remmers (bijv. selegiline). Wacht 14 dagen na staken om trazodon te gebruiken. (3) Versterkt versuffend effect i.c.m. centraal zenuwstelsel dempende middelen, zoals benzodiazepines en opioïden

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Overdosering kunnen sufheid, extreme vermoeidheid, coördinatieproblemen en braken veroorzaken. Nb sluit serotoninesyndroom uit. Sommige symptomen komen overeen.

Neem bij het vermoeden van een overdosering contact op met de dierenarts.

Dracht en lactatie:
Veiligheid tijdens de dracht en lactatie is bij dieren niet vastgesteld. Trazodon moet enkel gebruikt worden wanneer de voordelen voor de moeder opwegen tegen de potentiële risico's voor het nageslacht.

8. Wachttijden

Niet van toepassing

9. Bewaarcondities

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25 °C).

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie

Dit geneesmiddel wordt geproduceerd door:
Apotheek faculteit Diergeneeskunde
Yalelaan 106, 3584 CM Utrecht
apotheek.vet@uu.nl

Scan/klik
voor de website

12. Kanalisatie

Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en andere onjuistheden. Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.