

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Cisapride capsules en drank

Samenstelling:

Werkzame bestanddeel: capsules 10mg en de drank 5mg/ml en 40 mg/ml cisapride

De capsules bevatten de volgende hulpstof: carboxymethylcellulose.

De drank is een suspensie en bevat de volgende hulpstoffen: gemodificeerd zetmeel, natriumcitraat, citroenzuur, sucralose, natriumbenzoaat (0,1%), appelzuur en simeticon in water.

Eigenschappen:

Cisapride is een prokineticum; het zorgt ervoor dat het voedsel sneller de slokdarm, maag en darmen passeert zodat het niet te lang op één plaats blijft of terug kan stromen.

Doeldieren:

Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond de kat en bij paarden.

Indicaties:

Cisapride wordt gebruikt bij dieren met slokdarm- en/of maagdarmproblemen.. Door onvoldoende beweeglijkheid van de slokdarm, maag en/of darmen hoopt voedsel zich op in met name de maag, met als gevolg misselijkheid en braken.

Waarschuwingen en contra-indicaties:

Voorzichtigheid is geboden bij dieren met een hartafwijking. Bij dracht en lactatie alleen in overleg met de dierenarts gebruiken. Dit geneesmiddel niet gebruiken bij overgevoeligheid voor cisapride of één van de andere bestanddelen.

Toediening en dosering:

De gebruikelijke dosering voor de hond en de kat is 1 tot 3 x daags 0,2-0,5 mg/kg lichaamsgewicht.

De gebruikelijke dosering voor paarden is: 3 x daags 0,4mg/kg en voor veulens 3 x daags 0,33mg/kg.

De drank is een suspensie en moet voor ieder gebruik goed omgeschud worden! De capsules mogen geopend worden en de inhoud kan bijvoorbeeld over het voer worden gestrooid.

Bijwerkingen:

Cisapride geeft in normale doseringen zelden bijwerkingen. Bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn: darmgerommel, darmkrampen en/of diarree.

Interacties met andere geneesmiddelen:

Cisapride kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Laat de dierenarts weten als ook andere geneesmiddelen worden gegeven.

Door versnelde darmassage kan de absorptie van geneesmiddelen worden verminderd: het kan daarom nodig zijn om van geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte de serumspiegels te controleren.

Het gelijktijdig gebruik van cisapride met de middelen claritromycine, erytromycine, fluconazol, itraconazol, ketoconazol en procainamide wordt afgeraden in verband met een vergrote kans op ventriculaire aritmie ten gevolge van QT verlenging.

Fabrikant:

Dit geneesmiddel is gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Instructies voor het openen van de verpakking van de capsules:

Scheur telkens het zakje af bij de geperforeerde rand.

Scheur het afzonderlijke zakje open (druk de capsule niet door het foliepapier).

Bewaarcondities:

Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).

De drank is na openen nog 6 maanden houdbaar, mits bewaard bij kamertemperatuur of in de koelkast.

Bewaar de geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng restanten van het geneesmiddel, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts of apotheek.