Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Metronidazol 500 mg/ml drank

1. Doeldiersoorten
Paard

2. Dosering en wijze van gebruik
Voor inname via de mond.
Aanbevolen dosering:2 x daags 25 mg/kg (overeenkomend met 5 ml per 100 kg).

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Goed omschudden voor elk gebruik. Draag handschoenen bij elke toediening en was daarna goed de handen.
Geef de medicatie met wat voer om de kans op maagklachten te verminderen.

3. Samenstelling
Per milliliter drank:
Werkzaam bestanddeel:
Metronidazol 500 mg
Hulpstoffen**:**
Dit betreft een bereiding vanuit geregistreerd product. Hulpstoffen kunnen verschillen afhankelijk van de fabrikant. Informatie hierover is te vinden in de originele bijsluiter. Deze kan worden geraadpleegd via de geneesmiddeleninformatiebank op CBG-Meb.nl met behulp van het [RXXXX] nummer. Of neem contact op met de apotheek.

4. Indicaties
Metronidazol wordt toegepast bij de behandeling van infecties door micro-organismen die gevoelig zijn voor metronidazol.

5. Eigenschappen
Metronidazol is een antibioticum dat werkzaam is tegen vele soorten anaerobe bacteriën (waaronder Clostridia) maar ook tegen protozoën en flagellaten (Giardia en Trichomonas).

6. Bijwerkingen
Tijdens het gebruik van metronidazol kunnen de volgende bijwerkingen optreden: sufheid, coördinatiestoornissen, gebrek aan eetlust en diarree.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen
Niet gebruiken bij dieren met leveraandoeningen, ernstig zieke dieren en aan drachtige of zogende dieren.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:
Metronidazol is verdacht van het veroorzaken van genetische schade en kanker. Zorg daarom dat elk huidcontact met metronidazol wordt voorkomen. Draag altijd handschoenen tijdens het toedienen van dit geneesmiddel en was daarna goed de handen.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Laat de dierenarts daarom altijd weten als ook andere geneesmiddelen worden gegeven.
Gelijktijdig gebruik van clindamycine of tetracyclines, kan de werking van metronidazol versterken.

Dracht en lactatie:
Metronidazol dient niet toegediend te worden aan drachtige dieren of zogende dieren.

8. Wachttijden
Het paard moet uitgesloten worden/zijn voor humane consumptie.

9. Bewaarcondities
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
De drank is houdbaar tot de expiratiedatum, mits donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan
Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.
Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie
Dit betreft een bereiding vanuit een humaan geregistreerd product (Flagyl®) en wordt door Apotheek fD geleverd op basis van een Cascade toepassing ten behoeve van toepassing bij de genoemde doeldiersoort(en).

12. Kanalisatie
Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en andere onjuistheden.
Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.