

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Metronidazol 375 mg/ml poeder voor suspensie

1. Doeldiersoorten

Paard

2. Dosering en wijze van gebruik

Voor inname via de mond.

Aanbevolen dosering: 2 x daags 25 mg/kg (overeenkomend met 10 ml suspensie per 150 kg).

Aanmaken van de drank

Draag bij het aanmaken van de drank een P2 stofmasker en handschoenen (beide zijn meegeleverd).

Schud vóór het eerste gebruik de flacon Flagyl® krachtig om. Voeg vervolgens de gehele inhoud toe aan de flacon met droge stof. Schud het geheel krachtig. De 375mg/ml drank is nu klaar voor gebruik.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Goed omschudden voor elk gebruik. Draag handschoenen bij elke toediening en was daarna goed de handen.

Geef de medicatie bij een maaltijd of net na een maaltijd om de kans op maagklachten te verminderen.

3. Samenstelling

Per milliliter drank:

Werkzaam bestanddeel:

Metronidazol (als metronidazolbenzoaat) 375 mg

Hulpstoffen:

Dit betreft een bereiding vanuit geregistreerd product. Hulpstoffen kunnen verschillen afhankelijk van de fabrikant. Informatie hierover is te vinden in de originele bijsluiter. Deze kan worden geraadpleegd via de geneesmiddeleninformatiebank op CBG-Meb.nl met behulp van het [RXXXX] nummer. Of neem contact op met de apotheek.

4. Indicaties

Metronidazol wordt toegepast bij de behandeling van infecties door micro-organismen die gevoelig zijn voor metronidazol.

5. Eigenschappen

Metronidazol is een antibioticum dat werkzaam is tegen vele soorten anaerobe bacteriën (waaronder Clostridia) maar ook tegen protozoën en flagellaten (Giardia en Trichomonas).

6. Bijwerkingen

Tijdens het gebruik van metronidazol kunnen de volgende bijwerkingen optreden: sufheid, coördinatiestoornissen, gebrek aan eetlust en diarree.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen

Niet gebruiken bij dieren met leveraandoeningen, ernstig zieke dieren en aan drachtige of zogende dieren.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Metronidazol is verdacht van het veroorzaken van genetische schade en kanker. Zorg daarom dat elk huidcontact met, en inademing van, metronidazol wordt voorkomen. Draag een P2 stofmasker en handschoenen bij het aanmaken van de drank. Draag altijd handschoenen tijdens het toedienen van dit geneesmiddel en was daarna goed de handen.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Laat de dierenarts daarom altijd weten als ook andere geneesmiddelen worden gegeven. Gelijktijdig gebruik van clindamycine of tetracyclines, kan de werking van metronidazol versterken.

Dracht en lactatie:

Metronidazol dient niet toegediend te worden aan drachtige dieren of zogende dieren.

8. Wachtijden

Dier is uitgesloten voor humane consumptie.

9. Bewaarcondities

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

De poeder voor suspensie is houdbaar tot de expiratedatum, mits donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C). Na aanmaken is de drank 1 maand houdbaar bij kamertemperatuur.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie

Dit betreft een bereiding vanuit een humaan geregistreerd product (Flagyl®) en wordt door Apotheek fD geleverd op basis van een Cascade toepassing ten behoeve van toepassing bij de genoemde doeldiersoort(en).

12. Kanalisatie

Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.