Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Pyridostigminebromide 5 mg/ml drank

1. Doeldiersoorten
Honden en katten

2. Dosering en wijze van gebruik
Voor inname via de bek.
Scan/klik voor een instructievideo →
Aanbevolen dosering:2 – 3 x daags 0,2 - 2 mg/kg
(overeenkomend met 0,04 – 0,4 ml/kg).
Begin met een lage dosering en bouw langzaam op om de bijwerkingen te minimaliseren en de spierkracht te maximaliseren.

De werking treedt ongeveer 1 uur na inname in.
Een lagere dosis kan nodig zijn bij patiënten met nierinsufficiëntie

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Geef bij voorkeur op een lege maag omdat dan de opname beter is.
Lees voor gebruik de contra-indicaties en waarschuwingen!

3. Samenstelling
Per milliliter drank:
Werkzaam bestanddeel:
Pyridostigminebromide 5 mg
Hulpstoffen**:**
methylhydroxybenzoaat, citroenzuur, natriumcitraat en glucose

Het is een heldere vloeistof

4. Indicaties
Behandeling van myasthenia gravis

5. Eigenschappen
Pyridostigmine is een zogenaamde cholinesteraseremmer. Het blokkeert het enzym acetylcholinesterase reversibel (=omkeerbaar/tijdelijk). Hierdoor wordt de afbraak van acetylcholine geremd. Het is een indirect werkende parasympathicomimeticum. Het effect van acetylcholine wordt dus versterkt

6. Bijwerkingen
Maagdarmklachten (misselijkheid, braken, diarree en speekselen), ademhalingseffecten (meer slijmproductie en benauwdheid), effecten op het oog (miosis (kleine pupil), wazig zien, tranenvloed), hart- en vaatklachten (versnelde of juiste vertraagde hartslag, verlaagde bloeddruk), spierkrampen, zweten en zwakte.

De bijwerkingen zijn vaak afhankelijk van de dosering.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen
Niet gebruiken bij dieren de overgevoelig zijn voor pyridostigminebromide.
Niet gebruiken in geval van mechanische obstructie van het maagdarmkanaal of urinewegen.

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met (ernstige) benauwdheidsklachten, epilepsie, hyperthyreoïdie, verlaagde hartslag, hartritmestoornissen of maagzweren

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:
Pyridostigmine is een sterk werkzaam middel. Voorkom daarom blootstelling en draag handschoenen bij toedienen. Was na afloop de handen.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Combinatie met β-blokkers (zoals atenolol) kan de verlaging van de hartfrequentie versterken. Geneesmiddelen met tegenstelde werking (parasympaticolytica zoals atropine en butylscopolamine) kunnen wederzijds de werking verminderen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Bij een overdosering zullende verschijnselen beschreven onder 'bijwerkingen' nog ernstiger zijn. Een overdosis kan door een de dierenarts behandeld worden met atropine per injectie.

Dracht en lactatie:
Er is weinig informatie over gebruik van pyridostigmine tijdens de dracht. Het kan in geringe mate over de placenta gaan. Gebruik pyridostigmine daarom alleen als de voordelen voor de moeder groter zijn dan de potentiële risico's voor de puppies. Pyridostigmine komt in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Ook de opname vanuit het maagdarmkanaal van de puppy is laag.

8. Wachttijden
Niet van toepassing.

9. Bewaarcondities
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Ongeopende verpakking bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Na openen 3 maanden houdbaar.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan
Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie
Dit geneesmiddel wordt geproduceerd door:
Apotheek faculteit Diergeneeskunde
Yalelaan 106, 3584 CM Utrecht
apotheek.vet@uu.nl

Scan/klik
voor de website

12. Kanalisatie
Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en andere onjuistheden. Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.