Dit geneesmiddel is omgepakt vanuit een diergeneesmiddel dat geregistreerd is in een EU-lidstaat voor gebruik bij dezelfde doeldiersoort(en) of indicatie(s). Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Acetylsalicylzuur 500 mg/g poeder

1. Doeldiersoorten
Paard

2. Dosering en wijze van gebruik
Scan/klik voor een instructievideo →

Voor inname via de mond.
Aanbevolen startdosering: 1x daags 10 mg/kg (overeenkomend met 2g poeder/100kg).
Vervolgdosering: 1x daags 5 mg/kg (overeenkomend met 1g poeder/100kg)

Gebruik een balans om de gewenste poederportie af te wegen. Indien geen balans beschikbaar is, kan een maatschepje gebruikt worden. Let op: niet erg nauwkeurig!
Met kunststof maatlepels (uitgaande van 5 mg/kg):

Afgestreken hoeveelheid	Overeenkomend met […] ml	Overeenkomend met […] g	Voldoende voor […] kg LG paard (5 mg/kg)
¼ theelepel	1,25 ml	0,8 -0,9 g	80 -90 kg
½ theelepel	2,5 ml	1,7 g	170 kg
1 theelepel	5 ml	3,4 – 3,9 g	340 – 390 kg
½ eetlepel	7,5 ml	5,7 – 6,2 g	570 – 620 kg

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Het poeder bevat 50% NaCl (= keukenzout), dus meng door wat voer of appelmoes. Dien de appelmoesspuit na klaarmaken zo snel mogelijk toe! Acetylsalicylzuur ontleedt snel in water, dus ook als het verwerkt is in appelmoes. Bij deze ontleding (hydrolyse) ontstaan salicylzuur en azijnzuur. Salicylzuur geeft veel meer maagdarmklachten dan acetylsalicylzuur én het geeft geen remming van de trombocytenaggregatie (TA).

3. Samenstelling
Per gram poeder:
Werkzaam bestanddeel:
Acetylsalicylzuur 500 mg
Hulpstoffen**:**
Hulpstoffen kunnen verschillen afhankelijk van de fabrikant. Informatie hierover is te vinden in de originele bijsluiter. Deze kan worden geraadpleegd via de geneesmiddeleninformatiebank op CBG-Meb.nl met behulp van het [Rxxxxx] nummer op het etiket. Of neem contact op met de apotheek.

Onverdeeld poeder dat per individueel paard verdeeld moet worden in porties door middel van wegen of afmeten (zie instructies onder 2).

4. Indicaties
Remming van bloedplaatjesaggregatie en daarmee de bloedstolling bij paarden met onder andere thromboflebitis, hoefbevangenheid of (darm)infarcten.

5. Eigenschappen
Acetylsalicylzuur remt de aggregatie van rode bloedplaatjes (trombocyten) irreversibel door blokkering van de synthese van tromboxaan A2 in de trombocyt. Tromboxaan A2 bevordert TA.

6. Bijwerkingen

Bekende bijwerkingen bij mensen: verlengde bloedingstijd, overgevoeligheidsreacties en vermindering van eetlust.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen

Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor salicylaten
Niet gebruiken in geval van zeer ernstige leverinsufficiëntie

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:
Het staken van acetylsalicylzuur voorafgaand aan kleine operaties is in de meeste gevallen niet nodig. Voorafgaand aan een ingreep met potentieel belangrijke negatieve gevolgen bij een bloeding moet het gebruik ca. 7 dagen worden gestaakt.
Voorzichtigheid is geboden bij paarden die gevoelig zijn voor maagzweren, maagbescherming met omeprazol kan nodig zijn.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:
Draag handschoen tijdens het afmeten, afwegen en verwerken van de poederporties.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Glucocorticoïden zoals dexamethason en prednisolon en NSAID's zoals meloxicam, flunixine en firocoxib kunnen de ulcerogene werking van acetylsalicylzuur versterken. Het risico op maagzweren neemt toe bij hogere leeftijd, hogere doses en chronisch gebruik. Maagbescherming met omeprazol moet worden overwogen.

Dracht en lactatie:
Bij gebruik van acetylsalicylzuur als TA-remmer in mensen is over het algemeen geen nadelige effecten gezien bij de moeder, het ongeboren kind of de neonaat. Wel kan een (licht) verhoogd bloedingsrisico bij de moeder (tijdens en na de bevalling) en de pasgeborene niet worden uitgesloten, met name bij gebruik tot aan de partus. Het advies is de behandeling minimaal een week voorafgaand aan de partus te staken.

8. Wachttijden

Wachttijd paarden voor humane consumptie: 7 dagen.

9. Bewaarcondities

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie

Dit betreft een in Frankrijk geregistreerd diergeneesmiddel voor paarden en wordt omgepakt door Apotheek fD in potten van 100 gram met schroefdop ten behoeve van toepassing bij de genoemde doeldiersoort(en) of indicatie(s).

12. Kanalisatie

Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en andere onjuistheden. Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.