Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Zilvertriam 10 / 1 mg/g oorzalf

1. Doeldiersoorten

Scan voor een instructievideo →

Honden en katten

2. Dosering en wijze van gebruik

Voor toediening in het oor.
Dosering: 1x daags een deel van de spuit met zalf toedienen in het aangedane oor/oren. Gebruikelijk is om de gehele gehoorgang te vullen maar volg hierbij de instructies van uw dierenarts.

Aanwijzingen voor een juiste toediening
De zalf kan rechtstreeks vanuit de spuit toegediend worden in de gehoorgang. Het gebruik van een opzetcanule is meestal niet nodig en is mogelijk zelfs ongewenst in verband met het risico op het achterblijven van de canule in de gehoorgang.

Gebruik bij behandeling van beide oren aparte spuit voor het linker en het rechteroor, om kruisbesmetting te voorkomen.

3. Samenstelling

Per gram zalf:
Werkzaam bestanddeel:
Zilversulfadiazine 10 mg en triamcinolonacetonide 1 mg
Hulpstoffen**:**
witte vaseline, paraffine vloeibaar 110-230mPa.s
Geel-witte dikke zalf verpakt in een spuitvormige verpakking.

4. Indicaties

Zilvertriam oorzalf wordt toegepast voor de behandeling van ontstekingen van de uitwendige gehoorgang (otitis externa) die veroorzaak worden door bacteriën die gevoelig zijn voor zilversulfadiazine, in het bijzonder Pseudomonas aeruginosa infecties die niet hebben gereageerd op eerdere behandelingen.

5. Eigenschappen

Zilversulfadiazine is sterk werkzaam tegen Gram-negatieve en Gram-positieve pathogene micro-organismen, met name Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aerogenes en Klebsiella pneumoniae. Na opbrengen valt het deels uit elkaar in zilver(ionen) en sulfadiazine.
Triamcinolonacetonide is een corticosteroïd en werkt ontstekingsremmend. Het vermindert roodheid, zwellingen en jeuk.

6. Bijwerkingen

Zilversulfadiazine kan tot overgevoeligheidsreacties leiden, bij het dier of bij de persoon die de zalf toedient. Deze overgevoeligheid uit zich in irritaties, zwellingen en rode plekken. Triamcinolonacetonide kan aanleiding geven tot veel drinken en plassen. Gezien de lokale toepassing komen deze bijwerkingen zeer zelden voor.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen

Overgevoeligheid voor zilversulfadiazine of een van de hulpstoffen in de oorzalf.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Gebruik voor ieder oor een eigen verpakking en noteer L of R op de spuiten.
Deze oorzalf is bedoeld voor gebruik in de buitenste gehoorgang. Geen enkel oorpreparaat is geschikt voor gebruik in het middenoor. Als er sprake is van een geperforeerd trommelvlies èn lokale behandeling van de buitenste gehoorgang is geïndiceerd, heeft het gebruik van een oorzalf de voorkeur boven een oordruppel. Door de hogere viscositeit van de zalf is de kans dat het product het middenoor bereikt minder groot.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:
Handen wassen voor en na aanbrengen van de oorzalf. Overweeg het dragen van handschoenen.

Dracht en lactatie:
Over het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de dracht en lactatie zijn geen gegevens beschikbaar. Gezien de lokale toepassing kan het belang van het moederdier prevaleren.

8. Wachttijden

Niet van toepassing.

9. Bewaarcondities

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Ongeopende verpakking bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Na openen 1 maand houdbaar bij kamertemperatuur.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie

Dit geneesmiddel wordt geproduceerd door:
Apotheek faculteit Diergeneeskunde
Yalelaan 106, 3584 CM Utrecht
030 253 1598
apotheek.vet@uu.nl

Scan voor de website

12. Kanalisatie

Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en andere onjuistheden. Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.