

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Dorzolamide / Timolol oogdruppels

Farmaceutische vorm

Oogdruppel

Samenstelling

Werkzame bestanddelen: dorzolamide 20mg/ml (als dorzolamidehydrochloride) en timolol 5mg/ml (als timololmaleaat)

Bevat de volgende hulpstoffen: mannitol, hydroxyethylcellulose, benzalkoniumchloride, natriumcitraat, natriumhydroxide, water voor injectie.

Eigenschappen

Dorzolamide is een zogenoemde koolzuuranhydraseremmer. Timolol is een zogenoemde bètablokker.

Beide middelen verlagen de oogboldruk door de kamerwaterproductie te verminderen, maar doen dat op een verschillende manier.

Doeldieren

Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond en de kat.

Toepassing:

Dorzolamide/Timolol oogdruppels worden gebruikt bij glaucoom. Dit is een verhoogde oogboldruk. Een te hoge druk in de oogbol kan de oogzenuw beschadigen, wat tot gezichtsveldverlies en mogelijk blindheid leidt.

Waarschuwingen en contra-indicaties

Dit geneesmiddel niet gebruiken bij ernstige nierproblemen en bepaalde hartaandoeningen. Dit geneesmiddel met voorzichtigheid gebruiken bij (chronische) luchtwegvernauwing.

Deze oogdruppels niet gebruiken bij de dracht en tijdens melkgift.

Toediening / Dosering

De gebruikelijke dosering is 2x per dag 1 druppel op het betreffende oog of op beide ogen.

Als tevens andere oogdruppels worden gegeven, dan moet er 10 minuten zitten tussen de toediening van de oogdruppels.

Let op: **Raak het oog of ooglid niet aan met de druppelaar!!!**

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn lokale irritaties zoals tijdelijk wazig zicht, branderig en prikkend gevoel onmiddellijk na gebruik van de druppels. Daarnaast komen de volgende bijwerkingen soms voor: pijn en jeuk in de ogen, ontsteking van voorhoofdholtes en vermoeidheid.

Interacties met andere geneesmiddelen

Gelijktijdige toediening van andere oogboldruk verlagende druppels is mogelijk. Tussen de toediening van deze middelen moet wel minimaal 10 minuten zitten. Geneesmiddelen kunnen elkaar mogelijk beïnvloeden. Laat de dierenarts daarom altijd weten indien ook andere geneesmiddelen worden gegeven.

Fabrikant

Mylan, Bunschoten.

Registratienummer: RVG 105655

Bewaarcondities:

De oogdruppels zijn houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum, mits bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C) en donker (in het doosje).

Na openen zijn de oogdruppels nog 28 dagen houdbaar bij kamertemperatuur en in het donker (in het doosje).

Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Breng restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts