

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Diazoxide suspensie/ Proglycem® capsule

Farmaceutische vorm:

Capsule en suspensie

Samenstelling

Proglycem® capsules bevatten 100 mg per capsule en de hulpstoffen lactose, magnesiumstearaat, titaniumdioxide (E171) en gelatine in capsules voor oraal gebruik

Diazoxide suspensie bevat 20 mg diazoxide per ml en als hulpstoffen MOB,POB, citroenzuur, sacharose, Al-Mg silicas coll en carmellose.

Eigenschappen

Diazoxide geeft na inname onmiddellijk een verhoging van de bloedsuikerspiegel. In het lichaam is er een evenwicht tussen insuline en bloedsuiker. Insuline wordt door de alvleesklier afgegeven aan het bloed. Indien de alvleesklier teveel insuline afgeeft, daalt de hoeveelheid bloedsuiker in het bloed. Diazoxide remt de afgifte van insuline door de alvleesklier.

Doeldieren

Er is ervaring met het gebruik van diazoxide bij de hond, de kat en de fret.

Indicaties

Diazoxide wordt gebruikt bij de behandeling van een te lage suikerspiegel in het bloed door een hoge insulinespiegel als gevolg van een goedaardig of kwaadaardig gezwel in de alvleesklier (insulinoom). Deze behandeling met Diazoxide/Proglycem® mag alleen worden overwogen als andere specifieke medische therapie of operatieve ingrepen niet succesvol waren , of niet kunnen worden uitgevoerd.

Waarschuwingen en contra-indicaties

Diazoxide/Proglycem® mag niet worden gebruikt als uw hond een niet verklaarbare lage bloedsuikerspiegel heeft of hoge urinezuurspiegels heeft. Ook mag het niet gebruikt worden bij bepaalde hartaandoeningen.

Toediening / Dosering

De gebruikelijke dosering voor de hond

2 x daags 5 - 30 mg per kilogram lichaamsgewicht. Bij aanvang van de therapie wordt soms iets lager gedoseerd: 3 x daags 2,5mg/kg.

De gebruikelijke dosering voor de fret:

2 x daags 10mg/kg lichaamsgewicht.

Vaak wordt de behandeling met Diazoxide/Proglicem® gecombineerd met het geven van meerdere kleine koolhydraatarme voedingen per dag.

Regelmatige controle van de bloedsuikerspiegel in het bloed is vereist.

Aanwijzingen bij overdosering

Waarschuw onmiddellijk de arts als uw dier een te grote dosis

Diazoxide/Proglicem® heeft ingenomen.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van Diazoxide/ Proglicem® zijn gebrek aan eetlust, braken en/of diarree. Overige bijwerkingen die ook voorkomen zijn hartkloppingen, versnelde hartslag en vochtvasthouding.

Interacties met andere geneesmiddelen

Het effect of bijwerkingen van Diazoxide/Proglicem® kunnen door andere geneesmiddelen worden versterkt. Zorg daarom dat uw dierenarts op de hoogte is van de eventueel andere geneesmiddelen die uw dier gebruikt.

Fabrikant

De registratiehouder van Proglicem® capsules is Merck, Sharp & Dohm BV in Haarlem. Proglicem® is in het register ingeschreven onder RVG 06865. De suspensie wordt gemaakt door de apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Bewaarcondities

De capsules zijn houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).

De suspensie is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum. Na openen is de suspensie nog 1 maand houdbaar, mits bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).

Breng restanten van geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt ter vernietiging naar een dierenarts of apotheek.