

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Diazoxide suspensie/Proglycem® capsule

1. Doeldiersoorten

Honden, katten en fretten.

2. Dosering en wijze van gebruik

Voor inname via de bek.

Gebruikelijke dosering:

- Hond: 2x daags 5 - 30 mg/kg.

- Fret: 2x daags 10 mg/kg.

Bij honden wordt soms bij aanvang van de therapie iets lager gedoseerd: 3x daags 2,5 mg/kg.

Scan/klik voor een instructievideo →



Aanwijzingen voor een juiste toediening

Vaak wordt de behandeling met diazoxide gecombineerd met het geven van meerdere kleine koolhydraatarme voedingen per dag.

Regelmatige controle van de bloedsuikerspiegel in het bloed is vereist.

3. Samenstelling

Per milliliter drank/capsule:

Werkzaam bestanddeel:

Diazoxide

- Drank: 20 mg

- Proglycem® capsule: 100 mg

Hulpstoffen:

- Drank: zetmeel, natriumcitraat, citroenzuur, sucralose, natriumbenzoaat (<0.1%), appelzuur, simeticon, water.

- Proglycem® capsule: lactose, magnesiumstearaat, titaniumdioxide (E171) en gelatine.

4. Indicaties

Diazoxide wordt gebruikt bij de behandeling van een te lage suikerspiegel in het bloed door een hoge insulinespiegel als gevolg van een goedaardig of kwaadaardig gezwel in de alveesklier (insulinoom). Deze behandeling met diazoxide mag alleen worden overwogen als andere specifieke medische therapie of operatieve ingrepen niet succesvol waren, of niet kunnen worden uitgevoerd.

5. Eigenschappen

Diazoxide geeft na inname onmiddellijk een verhoging van de bloedsuikerspiegel. In het lichaam is er een evenwicht tussen insuline en bloedsuiker. Insuline wordt door de alveesklier afgegeven aan het bloed. Indien de alveesklier teveel insuline afgeeft, daalt de hoeveelheid bloedsuiker in het bloed. Diazoxide remt de afgifte van insuline door de alveesklier.

6. Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van diazoxide zijn gebrek aan eetlust, braken en/of diarree. Overige bijwerkingen die ook voorkomen zijn hartkloppingen, versnelde hartslag en vochtvasthouding.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen

Niet gebruiken bij dieren met een niet verklaarbare lage bloedsuikerspiegel of hoge urinezuurspiegels.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort:

Diazoxide mag niet gebruikt worden bij bepaalde hartaandoeningen. Als uw (huis)dier een hartaandoening heeft, meld dit dan bij de voorschrijver.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Laat de dierenarts daarom altijd weten als ook andere geneesmiddelen worden gegeven.

8. Wachtijden

Niet van toepassing.

9. Bewaarcondities

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Capsules en drank bewaren op een donkere en droge plek bij kamertemperatuur (15-25°C). Houdbaar tot einde datum verpakking.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie

Dit geneesmiddel wordt geproduceerd door:

Apotheek faculteit Diergeneeskunde

Yalelaan 106, 3584 CM Utrecht

apotheek.vet@uu.nl



Scan/klik
voor de website

12. Kanalisatie

Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.