

*Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.*

## **Acetylcysteïne bruistablet**

### **Farmaceutische vorm**

Bruistablet om een oor-spoelmiddel te bereiden.

### **Samenstelling**

Werkzame bestanddeel: acetylcysteïne 600mg

Bevat de volgende hulpstoffen: natriumwaterstofcarbonaat, citroenzuur, aspartaam, citroenaroma.

### **Eigenschappen**

Acetylcysteïne is een mucolyticum. Dit wil zeggen dat het oorsmeer, slijm en pus (in ogen, oren, luchtwegen) verdunt, waardoor het makkelijker te verwijderen is.

### **Doeldieren**

Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond en de kat

### **Toepassing**

Acetylcysteïne wordt gebruikt bij aandoeningen waarbij de aanwezigheid van slijm of pus de medicamenteuze behandeling verstoort. Door het verwijderen van pus en slijm kan de werkzame stof van andere geneesmiddelen beter op de plek van werking komen.

### **Waarschuwingen en contra-indicaties**

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor acetylcysteïne.

De lokale toepassing kan gebruikt worden tijdens de dracht en bij zogen van pups.

### **Toediening / Dosering:**

Voor gebruik in het oor:

Los één bruistablet van 600mg op in 10ml kraanwater. Wacht tot de oplossing niet meer bruist. Leg de hond op z'n zij en breng vervolgens met behulp van een spuitje de oplossing in de gehoorgang. Laat de oplossing circa 10 minuten in het oor inwerken. Daarna mag de hond weer opstaan en de oplossing uitschudden.

## **Bijwerkingen**

Bijwerkingen zijn beperkt omdat acetylcysteïne lokaal wordt toegepast. Lokale irritatie van de gehoorgang door deze behandeling is mogelijk. De hond zal na toepassen van deze oorspoeling wat naar citroen ruiken.

## **Interacties met andere geneesmiddelen**

Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Laat de dierenarts daarom altijd weten als ook andere geneesmiddelen worden gegeven, met name als ook andere middelen in het oor worden toegepast. Gebruik de acteylcysteïne oplossing altijd voordat andere geneesmiddelen in het oor worden aangebracht.

## **Fabrikant**

TEVA

RVG nummer 57487

## **Bewaarcondities:**

Het product is houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum, mits droog en bij kamertemperatuur (15 -25°C) bewaard.

Na oplossen van de tablet de oplossing direct gebruiken.

Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Breng restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts