

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Terbinafine suspensie

Farmaceutische vorm:

Suspensie.

Samenstelling:

Werkzame bestanddeel: terbinafine 10mg/ml
Bevat de volgende hulpstoffen: acetem.

Eigenschappen:

Terbinafine, een stof die behoort tot een groep geneesmiddelen die antischimmelmiddelen worden genoemd. Door de remming van de synthese van ergosterol, een onderdeel van de schimmelcelmembraan, wordt de groei van schimmels geremd of de schimmel wordt zelfs gedood.

Doeldieren:

Er is tot nu toe enige ervaring met het gebruik van terbinafine bij de konijnen, cavia's en vogels. Het wordt echter veelvuldig gebruikt bij diverse schimmelinfecties bij de mens.

Indicaties:

Indicaties voor het gebruik van terbinafine zijn diverse soorten systemische schimmel infecties bij de konijnen, cavia's en vogels. Voornamelijk bij huidschimmels, incidenteel bij meningitis of aspergillose (in combinatie met andere antischimmelmiddelen) .

Waarschuwingen en contra-indicaties:

De hulpstof acetem heeft een vrij sterke, azijnzuurachtige geur. Het is echter niet schadelijk en is vrijwel smaakloos.

Gebruik terbinafine niet of in een lagere dosering bij dieren met ernstig lever-of nierfalen.

Terbinafine remt het metabolisme van: amitriptyline, carbamazepine, imipramine en nortriptyline. Dit zijn echter stoffen die doorgaans niet bij dieren worden gebruikt.

Toediening / Dosering:

Schudden voor gebruik.

Het is aanbevolen om de suspensie toe te dienen met wat eten.

De gebruikelijke dosering is:

Vogels:

10-15 mg/kg, overeenkomend met 1-1,5 ml/kg,
1-2 x daags gedurende 4 weken.

Cavia's en konijnen (bij huidschimmel):

10-30mg/kg, overeenkomend met 1-3 ml/kg,
1 x daags gedurende 4-6 weken

Konijnen (meningitis of aspergillose):

100mg/kg, overeenkomend met 10 ml/kg,
1-2 x daags gedurende 3 weken

Wijze van innemen:

U kunt de voorgeschreven hoeveelheid afmeten met de door de apotheek meegegeven doseerspuit. U mag dit geneesmiddel niet mengen met water. Acetem is een olieachtige stof en dit mengt niet goed met water. Was de doseerspuit na gebruik dan ook niet af met water, maar reinig het eenmaal per week met warm sop. Laat het daarna goed drogen voordat u het weer gebruikt.

Indien u toch wenst om het vaker te reinigen, doe dit dan na de laatste gift van de dag en zorg dat de spuit goed droog is voor het weer gebruikt wordt.

Bijwerkingen:

Door de beperkte ervaring met het gebruik van terbinafine bij dieren zijn de bijwerkingen nog niet duidelijk in beeld, maar de bijwerkingen die op basis van de stoffeïenschappen mogelijk kunnen optreden zijn over het algemeen mild van aard. Gastro-intestinale klachten zoals buikpijn, misselijkheid, verminderde eetlust en diarree kunnen gezien worden.

Fabrikant:

De suspensie van 10 mg/ml wordt ad-hoc gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Bewaarcondities en houdbaarheid:

De suspensie moet bewaard worden bij kamertemperatuur (15-25°C).

De houdbaarheid na aanmaken van de suspensie is 6 weken mits vrijgehouden van water.

De expiratedatum staat vermeld op het etiket van de flacon.

Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Breng restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts of apotheek.