

*Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.*

## **Ciclosporine 2% oogdruppels**

### **Samenstelling:**

Werkzame bestanddeel: ciclosporine 20mg/ml.

Bevat de volgende hulpstoffen: miglyol.

### **Eigenschappen:**

Ciclosporine stimuleert de traanproductie. Tevens onderdrukt het de werking van het afweersysteem.

### **Doeldieren:**

Er is ervaring met het gebruik van ciclosporine bij de hond.

### **Indicaties:**

Ciclosporine oogdruppels worden toegepast bij een bepaalde vorm van "te droge ogen" (keratoconjunctivitis sicca).

Ciclosporine veroorzaakt een toename van de traanvochtproductie. Deze toename van de traanvochtproductie treedt echter pas op na een behandelingsduur van 2 à 3 weken.

### **Waarschuwingen en contra-indicaties:**

Als het hoornvlies is beschadigd, kan het beter zijn dit middel niet te gebruiken omdat ciclosporine mogelijk de wondgenezing remt.

Houdt u strikt aan de aanwijzingen van de dierenarts. Vermijd contact met het geneesmiddel en was zorgvuldig uw handen na toediening van de oogdruppels.

### **Toediening / Dosering:**

De gebruikelijke dosering is 2x per dag 1 druppel op het oog. Wanneer het gewenste effect bereikt is, kan door de dierenarts de dosering worden verlaagd naar 1x per dag.

De behandeling wordt meestal gestopt indien na een behandelingsduur van 3 maanden geen verbetering is opgetreden.

Let op: bij toediening van de oogdruppels het oog of het ooglid niet met de druppelaar aanraken.

### **Bijwerkingen:**

Over het algemeen worden deze oogdruppels goed verdragen. Sommige honden lijken last te hebben van enige irritatie, o.a. blijkend uit roodheid van het bindvlies. Doordat ciclosporine de lichaamseigen afweer onderdrukt kunnen eventueel infecties naar boven komen. Het gebruik van deze oogdruppels leidt slechts zelden tot bijwerkingen elders in het lichaam.

### **Interacties met andere geneesmiddelen:**

Geneesmiddelen die trimethoprim met een sulfonamide bevatten kunnen als neveneffect een vermindering van de traanvochtproductie geven en mogelijk zelfs tot "droge ogen" leiden. Hierdoor kan het effect van de ciclosporine oogdruppels verminderd zijn.

### **Fabrikant:**

Dit geneesmiddel is gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

### **Bewaarcondities:**

De oogdruppels zijn houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).

Na openen zijn de oogdruppels 1 maand houdbaar bij kamertemperatuur.