

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Cyproheptadine capsules 50mg en 150mg

Farmaceutische vorm:

capsule

Samenstelling:

Werkzame bestanddeel: cyproheptadineHCl 50mg en 150mg.

Bevat de volgende hulpstoffen: microkristallijne cellulose.

Eigenschappen:

Cyproheptadine is een zogenoemd antihistaminicum. Dat wil zeggen dat het de werking van histamine in het lichaam onderdrukt. Histamine is één van de stoffen in het lichaam die verantwoordelijk is voor allergische reacties. Indien het lichaam in aanraking komt met iets waar het overgevoelig voor is, komt als reactie hierop histamine vrij in het lichaam. Daarnaast heeft cyproheptadine ook een zwak remmende werking op andere lichaamseigen stoffen waardoor het een licht kalmerende werking heeft.

Doeldieren:

Er is ervaring met het gebruik van cyproheptadine bij paarden.

Indicaties:

Cyproheptadine wordt toegepast bij de behandeling van paarden die last hebben van fotofobisch hoofdschudden (lichtschuwheid). Cyproheptadine kan ook gebruikt worden bij hoofdschudden met een andere oorzaak.

Cyproheptadine wordt ook toegepast bij paarden met verminderde eetlust.

Waarschuwingen en contra-indicaties:

Cyproheptadine valt volgens het FEI-reglement onder 'gecontroleerd medicijngebruik'. Gebruik tijdens een wedstrijd is niet toegestaan.

Over het gebruik van cyproheptadine tijdens de dracht bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijk schadelijke gevolgen te beoordelen. Gebruik cyproheptadine bij deze patiënten alleen na overleg met de dierenarts.

Gevolgen voor het paard dat niet uitgesloten is voor humane consumptie:

Cyproheptadine is niet toegestaan in te consumeren dieren. Voor paarden is

echter een uitzondering gemaakt. Het gebruik van dit geneesmiddel moet

geregistreerd worden in het paspoort en een wachttermijn van 6 maanden moet in acht genomen worden.

Toediening / Dosering:

Paarden met fotofobisch hoofdschudden: De gebruikelijke dosering is 2x per dag 0,3 mg/kg. Indien het paard suf wordt, wordt de dosering verlaagd. Het effect is pas waarneembaar na ongeveer 5 dagen.

Als de behandeling aanslaat, wordt deze voortgezet met dezelfde dosering gedurende het zomerseizoen (seizoensgebonden hoofdschudden). Bij niet-seizoensgebonden hoofdschudden wordt elke dag cyproheptadine gegeven.

Paarden met verminderde eetlust: De gebruikelijke dosering is 2x per dag 0,25mg/kg gedurende een maand.

Bijwerkingen:

Cyproheptadine kan in enige mate sufheid en slaperigheid veroorzaken. Meestal is dit van voorbijgaande aard. Indien bij de gegeven dosering het paard te sloom of suf wordt kan in overleg met de dierenarts de dosering verlaagd worden. Zelden worden bijwerkingen zoals koliek, onwillekeurige spierbewegingen, zweten en trillen gezien.

Interacties met andere geneesmiddelen:

Combinatie van cyproheptadine met kalmeringsmiddelen kan resulteren in extra sufheid en slaperigheid. Wanneer de geneesmiddelen worden gebruikt die tot de groep MAO-remmers hoort (bijv. Selegiline) dan kunnen reacties optreden als een droge mond, droge ogen, obstipatie, verwardheid en onrust.

Fabrikant:

Dit geneesmiddel is gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Bewaarcondities:

De capsules zijn houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits in het donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).

Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts of apotheek.