

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Fenoxybenzamine HCl capsules

1. Doeldiersoorten

Hond

2. Dosering en wijze van gebruik

Scan voor een instructievideo →



Voor inname via de bek.

Aanbevolen dosering: 2x daags 0,25 – 0,5 mg/kg.

De dosering kan geleidelijk worden verhoogd. Doseringen hoger dan 1 mg/kg per keer geven over het algemeen te veel bijwerkingen op het maagdarm kanaal.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Kan met of zonder eten gegeven worden. Verdeel de twee giften zo goed mogelijk over de dag. Maak de capsules niet open.

3. Samenstelling

Per capsule:

Werkzaam bestanddeel:

FenoxybenzamineHCl 1, 2.5, 5 of 10 mg

Hulpstoffen:

FenoxybenzamineHCl capsules: Cellulose, gelatine

Dibenzyran®: lactose, magnesiumstearaat, gelatine, erythrosine, indigocarmin, chinolinegeel

4. Indicaties

Fenoxybenzamine wordt gebruikt bij voornamelijk honden ter verlaging van de bloeddruk bij een feochromocytoom (= gezwel in de bijnier) tot aan chirurgie, of als dit niet mogelijk is, chronisch.

Bij niet te opereren en hormoon-actieve feochromocytoom wordt het gecombineerd met tyrosinekinase remmers (TKI's), zoals toceranib.

5. Eigenschappen

Fenoxybenzamine is een zogenoemd sympatholyticum (α -receptor blokkerend). Het verwijdt daardoor de bloedvaten waardoor de bloeddruk daalt.

6. Bijwerkingen

Bijwerkingen treden vooral op bij de start van de behandeling. Deze bijwerkingen zijn een lage bloeddruk, pupilvernauwing, hartkloppingen en een loopneus.

Daarnaast kunnen maagdarmlaasten zoals overgeven en diarree voorkomen.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen

Niet gebruiken bij dieren met ernstige hart- of nierproblemen

Niet gebruiken in combinatie met (andere) bloeddruk verlagende middelen. Vooral de combinatie met beta-blokkers moet vermeden worden. Dit kan een te sterke bloeddruk daling veroorzaken. Laat de dierenarts altijd weten indien ook andere geneesmiddelen worden gegeven.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Fenoxybenzamine brengt risico's met zich mee voor personen die dit niet nodig

hebben. Om onnodige blootstelling te voorkomen, mogen de capsules niet worden geopend.

Dracht en lactatie:

Er zijn te weinig gegevens over gebruik van dit geneesmiddel tijdens dracht en lactatie daarom zijn de risico's voor drachtige dieren en pups onbekend.

8. Wachttijden

Niet van toepassing.

9. Bewaarcondities

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Houdbaar tot einde datum verpakking.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie

Dit geneesmiddel wordt geproduceerd/geleverd door:

Apotheek faculteit Diergeneeskunde

Yalelaan 106, 3584 CM Utrecht

apotheek.vet@uu.nl



Scan of klik
voor de website

12. Kanalisatie

Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.