

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Terazosine tabletten

Farmaceutische vorm:

Tablet.

Samenstelling:

Werkzame bestanddeel: terazosine 2mg en 5mg (als hydrochloride dihydraat).
Bevat de volgende hulpstoffen: lactose monohydraat, maïszetmeel, povidon (K-30), crospovidon, talk, magnesiumstearaat (E572), 2mg tablet: cholinegeel (E104), 5mg tablet: geel en rood ijzeroxide.

Eigenschappen:

Terazosine vermindert de onwillekeurige samentrekkingen van de spieren van de urinebuis en heeft ook een bloeddruk verlagend effect.

Doeldieren:

Er is (tot nu toe beperkte) ervaring met het gebruik van terazosine bij de hond en de kat.

Indicaties:

Terazosine wordt gebruikt bij dyssynergie (= niet helemaal goed samenwerken van de spieren) veroorzaakt door coördinatiestoornissen van de spieren van de urinebuis of na obstructie of veelvuldige catheterisatie om de urinebuizen te doen ontspannen.

Waarschuwingen en contra-indicaties:

Gebruik terazosine niet als de hond of kat hartproblemen heeft. Bij verminderde leverfunctie wordt het gebruik van terazosine afgeraden.

Over het gebruik van terazosine tijdens de dracht of tijdens de melkgift zijn onvoldoende gegevens bekend. Gebruik terazosine in die gevallen slechts in overleg met de dierenarts.

Toediening / Dosering:

Er is beperkte ervaring met terazosine. De gebruikelijke dosering voor de hond is momenteel 2 x per dag 0,25 mg per kilogram lichaamsgewicht van de hond, eventueel opgehoogd tot 0,5 mg/kg indien er geen bijwerkingen zijn opgetreden.

De gebruikelijke dosering voor de kat is 2 x per dag 0,5 mg per kilogram lichaamsgewicht van de kat.

De dosering van terazosine kan variëren per individueel dier en wordt vastgesteld door de dierenarts.

Bijwerkingen:

Door de beperkte ervaring met het gebruik van terazosine bij de hond en de kat zijn de bijwerkingen nog niet duidelijk in beeld. De bijwerkingen die op basis van de stoffeïenschappen verwacht kunnen worden zijn duizeligheid, hartkloppingen, slaperigheid, braken, diarree of obstipatie (=verstopping) of vochtophoping in de weefsels.

Interacties met andere geneesmiddelen:

Terazosine kan in combinatie met bloeddruk verlagende geneesmiddelen een sterke bloeddruk daling veroorzaken. Indien de hond of de kat geneesmiddelen gebruikt voor een te hoge bloeddruk, overleg dan met de dierenarts.

Fabrikant:

Pharmachemie BV, RVG 26357 en 26358.

Bewaarcondities:

De tabletten zijn houdbaar tot de op het etiket of op de verpakking aangegeven datum, mits bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).

Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts of apotheek.