

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Triamcinolonacetonide oorzalf

Farmaceutische vorm:

Oorzalf.

Samenstelling:

Werkzaam bestanddeel: triamcinolonacetonide 1,0 mg/g.

Bevat de volgen de hulpstoffen: witte vaseline, paraffine vloeibaar
110-230mPa.s.

Eigenschappen:

Triamcinolonacetonide is een corticosteroïd en werkt ontstekingsremmend. Het vermindert roodheid, zwelling en jeuk. Tevens remt het de productie van oorsmeer.

Doeldieren:

Er is ervaring met het gebruik van triamcinolonacetonide bij de hond en (in beperkte mate) bij de kat.

Indicaties:

Triamcinolonacetonide oorzalf wordt toegepast voor de behandeling van ontstekingen van de uitwendige gehoorgang nadat een bacteriële infectie behandeld is met een antibioticum bevattende oorzalf. Het wordt ook toegepast om de productie van oorsmeer te verminderen, zodat de kans op een nieuwe infectie wordt verkleind.

Waarschuwingen en contra-indicaties:

Deze oorzalf is bedoeld voor gebruik in de buitenste gehoorgang. Geen enkel oorpreparaat is geschikt voor gebruik in het middenoor. Als er sprake is van een geperforeerd trommelvlies en lokale behandeling van de buitenste gehoorgang is geïndiceerd, heeft het gebruik van een oorzalf de voorkeur boven een oordruppel. Door de hogere viscositeit van de zalf is de kans dat het product het middenoor bereikt minder groot.

Over het gebruik van dit middel tijdens de dracht zijn geen gegevens beschikbaar.

Toediening / Dosering:

De dierenarts dient voor gebruik van deze oorzalf de gehoorgang schoon te spoelen. Gebruikelijke startdosering is 1 x per dag de gehoorgang opvullen met zalf. In de loop van de behandeling in overleg met de dierenarts afbouwen in frequentie (niet in hoeveelheid).

De zalf kan rechtstreeks vanuit de injector toegediend worden in de gehoorgehoorgang. Het gebruik van een canule is meestal niet nodig en is zelfs ongewenst in verband met het risico op het achterblijven van de canule in de gehoorgang. Zie QR code voor een instructie.

Gebruik, als u beide oren moet behandelen, aparte injectoren voor het linker en rechter oor, in verband met mogelijke (her)besmetting.

Bijwerkingen:

Gezien de lokale toepassing zijn er geen bijwerkingen te verwachten. In een enkel geval kan irritatie optreden van de huid van het oor.

Interacties met andere geneesmiddelen:

Wisselwerking met andere geneesmiddelen is niet te verwachten.

Fabrikant:

Dit geneesmiddel is gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Bewaarcondities:

Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits donker en droog bewaard bij kamertemperatuur.

Na openen is de oorzalf 1 maand houdbaar.

Instructiefilm voor het toedienen van oorzalf bij de hond:

Zie: <https://vimeo.com/242065249/d09d7d48a6>

Of scan de code:

