

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Trilostane capsules

Samenstelling:

Werkzame bestanddeel: trilostane 5mg of 2mg

Bevat de volgende hulpstoffen: maïszetmeel, lactose, magnesiumstearaat en cellulose

Eigenschappen:

Trilostane remt selectief en herstelbaar de aanmaak van het hormoon cortisol door de bijnierschors.

Doeldieren:

Er is ervaring met het gebruik van dit middel bij de hond.

Indicaties:

Trilostane wordt toegepast bij ziekten waarbij de bijnierschors te veel van het hormoon cortisol produceert, zoals de ziekte van Cushing.

Waarschuwingen en contra-indicaties:

Toepassing van trilostane bij honden met een verminderde nier- en/of leverfunctie of met anemie dient voorzichtig en in overleg met de dierenarts te gebeuren. Het is daarbij belangrijk dat wordt gecontroleerd op o.a. leverenzymen, elektrolyten, ureum, creatinine, hematocriet en hemoglobine. Ook bij infecties of grote verwondingen is voorzichtigheid geboden. Trilostane kan de natuurlijke afweer van de hond verminderen.

Wanneer honden anemie hebben of hebben gehad, gebruik trilostane dan met voorzichtigheid. Controle van de bloedspiegels wordt hierbij aangeraden.

Trilostane niet gebruiken tijdens de dracht. Het geneesmiddel kan schade toebrengen aan ongeboren dieren en leiden tot abortus. Over het gebruik tijdens de melkgift zijn onvoldoende gegevens bekend. Zwangere vrouwen moeten contact met trilostane vermijden.

Toediening en dosering:

Dosering wordt vastgesteld door de dierenarts op basis van het klinisch beeld en hormoontesten. De laagst mogelijke werkzame dosering kan per dier verschillen. Gemiddeld is 2 – 4 mg/kg per dag nodig.

Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden moeten contact met trilostane zoveel mogelijk vermijden. Indien zij toch de trilostane toedienen: draag handschoenen. En bij per ongeluk contact met de capsules daarna handen wassen met water en zeep.

Bijwerkingen:

Tijdens het gebruik van trilostane kunnen de volgende bijwerkingen optreden: diarree, braken, buikpijn en – krampen, spierpijn en duizeligheid. Ook zwakte, lusteloos en gebrek aan eetlust kunnen voorkomen. Aanbevolen wordt dan extra te controleren op elektrolyten in het serum.

Interacties met andere geneesmiddelen:

Bij gebruik van mitotane zal de bijnierfunctie verminderd zijn. Wacht na gebruik van mitotane tenminste 1 maand alvorens met trilostane te beginnen.

Trilostane kan in combinatie met bloeddrukverlagende middelen een te sterke bloeddrukdaling veroorzaken. Trilostane kan in combinatie met het geneesmiddel spironolacton het kaliumgehalte in het bloed verhogen. Zorg dat de dierenarts op de hoogte is van andere geneesmiddelen die het dier gebruikt.

Fabrikant:

Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Bewaarcondities:

De capsules zijn houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).

Instructie voor het openen van de strips:

Scheur de capsule af bij de geperforeerde rand.

Scheur de verpakking open (Druk de capsule niet door het folie of het papier).