

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Ranitidine 15 mg/ml drank

1. **Doeldiersoorten**

Honden en katten

2. **Dosering en wijze van gebruik**

Voor inname via de bek.

Gebruikelijke dosering: Honden: 2-3 x per dag 0,5 - 5 mg/kg.

Katten: 2x per dag 3,5 mg/kg

Bij patiënten met ernstige nierfunctiestoornissen dient de totale dagdosering gehalveerd te worden en in één gift, bij voorkeur voor het slapen toegediend te worden

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geef de ranitidine na de eerste voeding en voor het slapen. Bij een ééndaagse gift, geef de ranitidine voor het slapen/na de laatste voeding. 's Nachts wordt namelijk het meeste zuur aangemaakt.

3. **Samenstelling**

Per milliliter drank:

Werkzaam bestanddeel:

Ranitidine HCl 15 mg

Hulpstoffen:

hydroxyethylcellulose, dinatriumfosfaat, frambozenessence, glycerol, methylhydroxybenzoaat, natriumdiwaterstoffosfaat, saccharine natrium, sinaasappel essence en water.

Ranitidine is een kleurloze tot lichtgele drank in een bruine flacon met schroefdop

4. **Indicaties**

Ranitidine wordt voorgeschreven bij zweren in de maag of in de twaalfvingerige darm en bij lichte of matig-ernstige ontstekingen van de slokdarm. Deze ontstekingen ontstaan doordat er maagzuur bij oprispingen in de slokdarm terecht komt. Een andere indicatie is maagproblemen bij katten met nierfunctiestoornissen.

5. **Eigenschappen**

Ranitidine behoort tot de zogenoemde H₂-antagonisten. Het remt de aanmaak van maagzuur in de maag, waardoor er minder maagzuur is en ontstekingen van de wand van maag of slokdarm beter genezen.

6. **Bijwerkingen**

Bij normaal gebruik van ranitidine worden zelden bijwerkingen gezien. Mogelijke bijwerkingen zijn overgevoeligheidsreacties zoals netelroos, koorts en leverontsteking.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Dracht en lactatie:

Bij gebruik tijdens dracht zijn tot op heden geen afwijkingen gevonden. Ranitidine gaat over in de moedermelk, en gebruik wordt daarom ontraden tijdens de lactatie.

8. Wachttijden

Niet van toepassing.

9. Bewaarcondities

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren in de koelkast (2-8°C), niet in de vriezer. Houdbaar tot einde datum verpakking.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie

Dit betreft een magistrale bereiding voor humaan gebruik en wordt door Apotheek fD geleverd op basis van een Cascade toepassing ten behoeve van toepassing bij de genoemde doeldiersoort(en).

12. Kanaliserie

Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.