Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren of voor gebruik bij deze doeldiersoort. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Ranitidine drank

1. Doeldiersoorten

Katten en diersoorten met een laag lichaamsgewicht, zoals vogels, konijnen en kleine knaagdieren.

2. Dosering en wijze van gebruik

Voor inname via de snavel/bek.
Gebruikelijke dosering:
- Dieren met een laag lichaamsgewicht: 2x daags 2 – 5 mg/kg
- Katten: 2x per dag 3,5 mg/kg

Bij patiënten met ernstige nierfunctiestoornissen dient de totale dagdosering gehalveerd te worden en in één gift, bij voorkeur voor het slapen toegediend te worden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Geef de ranitidine na de eerste voeding en voor het slapen. Bij een ééndaagse gift, geef de ranitidine voor het slapen/na de laatste voeding. ’s Nachts wordt namelijk het meeste zuur aangemaakt.

3. Samenstelling

Per milliliter drank:
Werkzaam bestanddeel:
Ranitidine HCl 5 mg of 30 mg
Hulpstoffen**:**
ethanol, sorbitol, natriumdiwaterstoffosfaat, natriumfosfaat, natriumhydroxide, fosforzuur, saccharose, methyl/propylparahydroxybenzoaat en water.

Ranitidine drank is een kleurloze tot lichtgele oplossing in een bruine flacon.

4. Indicaties

Ranitidine wordt voorgeschreven bij zweren in de maag of in de twaalfvingerige darm en bij lichte of matig-ernstige ontstekingen van de slokdarm. Deze ontstekingen ontstaan doordat er maagzuur bij oprispingen in de slokdarm terecht komt. Een andere indicatie is maagproblemen bij katten met nierfunctiestoornissen.

5. Eigenschappen

Ranitidine behoort tot de zogenoemde H2-antagonisten. Het remt de aanmaak van maagzuur in de maag, waardoor er minder maagzuur is en ontstekingen van de wand van maag of slokdarm beter genezen.

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en andere onjuistheden. Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren of voor gebruik bij deze doeldiersoort. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

6. Bijwerkingen

Bij normaal gebruik van ranitidine worden zelden bijwerkingen gezien. Mogelijke bijwerkingen zijn overgevoeligheidsreacties zoals netelroos, koorts en leverontsteking.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Dracht en lactatie:
Bij gebruik tijdens dracht zijn tot op heden geen afwijkingen gevonden. Ranitidine gaat over in de moedermelk, en gebruik wordt daarom ontraden tijdens de lactatie.

8. Wachttijden

Niet van toepassing.

9. Bewaarcondities

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C), niet in de koelkast of vriezer. Houdbaar tot einde datum verpakking.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie

Dit betreft een (bereiding vanuit een) geregistreerd goedgekeurd diergeneesmiddel en wordt door Apotheek fD geleverd op basis van een Cascade toepassing ten behoeve van toepassing bij de genoemde doeldiersoort(en).

12. Kanalisatie

Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en andere onjuistheden. Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.