Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van verordening EU 2019/6, artikel 112 en 113. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Ursodeoxycholzuur capsules en tabletten

1. Doeldiersoorten
Honden en katten

2. Dosering en wijze van gebruik
Voor inname via de bek.
Scan/klik voor een instructievideo →
Gebruikelijke dosering: 1x daags 7,5 - 15 mg/kg. De dagdosering mag verdeeld worden over twee giften.
De duur van de behandeling is meestal lang (meer dan drie tot vier maanden). Er zal regelmatige controle moeten plaatsvinden van de leverfunctie.

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Ursodeoxycholzuur kan het beste met voer ingegeven worden. Ursofalk® suspensie bevat xylitol en mag daarom niet bij honden worden gebruikt.

3. Samenstelling
Per capsule/tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Ursodeoxycholzuur 30 (capsule), 150 of 300 (tabletten) mg
Hulpstoffen**:**
- Capsule: microkristallijne cellulose

- Tabletten: Hulpstoffen kunnen verschillen afhankelijk van de fabrikant. Informatie hierover is te vinden in de originele bijsluiter. Deze kan worden geraadpleegd via de geneesmiddeleninformatiebank op CBG-Meb.nl met behulp van het [Rxxxxx] nummer op het etiket. Of neem contact op met de apotheek.

Capsules: Kleurloze gelatine capsules met wit poeder.
Tabletten: Platte ronde witte tabletten met op één zijde een breukstreep.

4. Indicaties
Ursodeoxycholzuur wordt gebruikt als het dier last heeft van (kleine) galstenen of een chronische leveraandoening.

5. Eigenschappen
Ursodeoxycholzuur verlaagt het cholesterolgehalte van de gal, waardoor galstenen kunnen oplossen. Ursodeoxycholzuur heeft mogelijk ook een beschermende werking op de levercellen.

6. Bijwerkingen
Er zijn weinig bijwerkingen bekend. Soms kan diarree optreden.

7. Contra-indicaties en waarschuwingen
Niet gebruiken in geval van galstenen buiten de lever of indien er complicaties optreden door galstenen.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Ursodeoxycholzuur kan de opname van ciclosporine uit de darm verhogen, waardoor aanpassen van de ciclosporine dosering nodig kan zijn. Overleg in dit geval altijd eerst met de dierenarts.

Dracht en lactatie:
Over het gebruik van ursodeoxycholzuur tijdens dracht en tijdens de melkgift is onvoldoende bekend. Ursodeoxycholzuur is sterk aan eiwit gebonden en het is dus niet waarschijnlijk dat het in grote hoeveelheden overgaat in de moedermelk. Overleg in deze gevallen met de dierenarts.

8. Wachttijden
Niet van toepassing.

9. Bewaarcondities
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Houdbaar tot einde datum verpakking.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

10. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan
Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval. Lever ongebruikte (dier)geneesmiddelen of restanten hiervan altijd in bij een apotheek.

11. Bereidende instantie
Dit geneesmiddel wordt geproduceerd door:
Apotheek faculteit Diergeneeskunde
Yalelaan 106, 3584 CM Utrecht
apotheek.vet@uu.nl

Scan/klik
voor de website

12. Kanalisatie
Dit diergeneesmiddel is alleen beschikbaar op voorschrift van een dierenarts.

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en andere onjuistheden. Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.